

METHODUS

R. Martyn


PLANTARUM

CIRCA

968. f 12
2

CANTABRIGIAM

nascentium.



LONDINI:

Ex Officina RICHARDI REILY.

MDCCKXVII.

40



PLANTARUM

CIVICA

CANTABRIGIÆ



LONDINI:

EX OFFICINA RICHARDI HELLÆ

MDCCLXXII

dia
Al
ba
du
non
det
pot
in
tus,
ho
plu
Cun
mp
illis
Can
lum



LECTORI

S. P. D.

JOANNES MARTYN.

ANNI jam fere septuaginta elapsi sunt
ex quo Catalogum Plantarum circa
Cantabrigiam nascentium in lucem e-
didit Vir omni laude major Joannes Raius.
Ab illo tempore quam mutata sit Rei Her-
bariæ facies plerisque innotescit. Jam Metho-
dus Plantarum ad Naturæ Leges constituta
non modo utilis sed & necessaria omnibus vi-
detur. Ab illa certe nihil magis abhorre-
re potest quam Distributio Alphabetica, qua
in Catalogo suo usus est Scriptor modo lauda-
tus, quam tamen postea omnino deseruit. Me-
thodum naturalem a Cæsalpino inventam
plurimis locis auxit atque emendavit Raius.
Cum vero adeo rara sint utriusque libri Ex-
emplaria, ut vix ullo sint comparanda pretio:
Illis, qui a me aliquid in Rebus Botanicis
Cantabrigiæ discere cupiunt, haud injucun-
dum opus me suscepturum judicavi, si Plan-

tas illas quas circa Cantabrigiam tam Ravius, tam alii nonnulli haud segnes in Plantis indagandis invenerunt, ad Methodi naturalis leges disponerem. Quid vero a me in hoc opere praestitum sit, paucis accipe.

Generum tam summorum quam subalter-
norum notas ex Ravi Methodo transtuli: non
paucis tamen emendatis, quod partim ex alio-
rum, partim ex mea observatione feci. Vail-
lantium quippe clarissimum in floribus com-
positis; Dillenium eruditum in Muscis &
Fungis; Scheuchzerum celeberrimum, in
Cerealibus disponendis, ubique fere secutus
sum. Classis etiam unius aut alterius notas
adjeci, quamvis ex illa nullae omnino Plantae
circa Cantabrigiam inveniuntur, ne Metho-
dus nimis claudicaret. Ex variis Plantarum
Synonymis illud semper praeposui, quod in
Officinis receptum est, si modo cum Generis
Appellatione conveniat. Id vero pro nomine
Officinali semper habeo, quod in Pharma-
copoeia Londinensi Plantis singulis a Col-
legio celeberrimo adscribitur. Deinde sequi-
tur nomen, quod primum in Ravi Catalogo
habetur: & post illud Historiam ejus univer-
sam citavi, ubi integram Plantae descriptio-
nem, eamque satis plerumque accuratam in-
venies.

venies. *Synonyma* plura aut notas referre non
necessarium fore judicavi, nisi quod de Plan-
tis agatur, quæ in *Appendice* inveniuntur.
Cum enim *Appendix* rarius occurrat, illam
sere integram citare volui.

Cæterum hoc loco monendus es, amice Lec-
tor, hunc libellum, utcumque typis manda-
tum, non tamen publici juris esse factum.
Pauca Exemplaria impressa volui: cum in
eorum tantummodo gratiam conscripserim, qui
a me Botanicen discere dignati fuerint. Ne-
que enim is sum qui Librum paucis diebus
conscripsum, & prælo raptim commissum,
adeoque mendis ubique scatentem, publici juris
facere auderem. Discipulis meis Errores
demonstrare in Prælectionibus poteram. Ami-
cis qui a me prætermittas maculas ostenderint
gratias acturus sum. Inimicis (si qui sunt)
qui calumniandi animo hallucinationes ob-
jecerint, pro singulis Erroribus quos illi ani-
madverterint, me plures ostensurum esse
spondeo.

Dabam Londini
Martii 31. 1727.

Explicatio

Explicatio nominum Auctorum citatorum.

Alm. v. Pluk.

Amalth. v. Pluk.

Cat. Cant. Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nascentium. Cantab. 1660.

Cat. Cant. App. Appendix ad Catalogum prædictum. Edit. alt. Cantab. 1685.

Dillen. Cat. Giff. Jo. Jac. Dilleni Catalogus Plantarum sponte circa Gissam nascentium. Franc. ad Meen. 1719.

Gundelsb. Andreas Gundelsheimer apud Jorenium in Hodego Botanico. Franc.

Hist. Historia Plantarum Auctore Joanne Raio Lond. 1686. & 1688.

H. Ox. Plantarum Historiæ Universalis Pars tertia Auctore Roberto Morison, post Auctoris mortem a Jacobo Bobartio absoluta. Oxon. 1699.

Hofm. Mauritiî Hofmanni Floræ Alterfinæ Deliciæ sylvestres & hortenses. Altorfii 1662.

Mont. Catalogi Stirpium Agri Bononiensis Prodrômus, Gramina ac hujusmodi affinia complectens. a Josepho Monti. Bononiæ 1719.

Mor. Hist. Plantarum Historiæ Universalis Pars secunda Auctore Roberto Morison. Oxonii 1680.

Mor. Umb. Plantarum Umbelliferarum Distributio nova per Tabulas Cognationis & Affinitatis ex Libro Naturæ observata & detecta Authore Roberto Morison. Oxonii 1672.

Pluk. Alm. & Amalth. Leonardi Plukenetii Almagestum & Amaltheum. Lond.

Riv. Irr. mon. Augusti Quirini Rivini Ordo Plantarum quæ sunt Flore Irregulari monopetalo. Lipsiæ. 1690.

— tet. Ejusd. Ordo Plantarum quæ sunt
ore Irregulari tetrapetalo. 1691.

— pent. Ejusd. Ordo Plantarum quæ sunt
ore Irregulari pentapetalo. 1699.

Scheuch. Agrost. Agrostographia sive Graminum,
ancorum, Cyperorum, Cyperoidum, iisque affi-
m Historia. Authore Joanne Scheuchzero.

Supp. Joannis Raii Historiæ Plantarum Tomus
rtius: qui est Supplementum duorum præceden-
um. Lond. 1704.

Syn. Joannis Raii Synopsis Methodica Stirpium
Britannicarum. Editio Tertia emendata & aucta
Joanne Jacobo Dillenio. Lond. 1724.

Tourn. Inst. Josephi Pitton Tournefort Instituti-
es Rei Herbariæ. Paris. 1700.

Vaill. Mem. Acad. Sebastianus Vaillantius in
Commentariis Academiae Regiæ Scientiarum
Paris.

METHODUS

[illegible]

SECRET



METHODUS
 PLANTARUM
 CIRCA
 CANTABRIGIAM
 nascentium.

P LANTÆ primario in duos Ordines
 dividuntur; inferiorem & superiorem.
 Ordo inferior illas continet, quarum
 Flores & Semina nudis oculis sunt in-
 conspicua: quatuor autem Generibus
 seu Classibus constat; *Submarinis, Fungis, Muscis,*
& Capillaribus dictis.

B

GENUS

GENUS I.

PLANTAE SUBMARINAE

vocantur, quæ in fundo maris, vel in rupibus marinis nascuntur, & vel aquis perpetuo immerguntur; vel singulis saltem æstuum accessibus. Ex hoc genere autem nullæ, opinor, circa *Cantabrigiam* habentur.

GENUS II.

FUNGI

nihil fere habent commune cum *Plantis perfectioribus*: neque enim color eis communiter herbaeus, nec textura analogæ, nec folium propriè dictum; brevissimo temporis spatio plerique oriuntur & brevis pariter ævi sunt.

Amanita

est *Fungi* Genus pediculo donatum, pileatum & lamellatum.

Amanita campestris, alba superne, inferne rubens *Dillen. Cat. Giff. 177.* Fungi esculenti *Cat. Cant. 57.* Fungus campestris, albus superne, inferne rubens *J. B. Hist. 87.*

Boletus.

est *Fungi* Genus pediculo donatum, pileatum, non lamellatum.

Boletus

Boletus esculentus rugosus fulvus Tourn. Inst.
 561. *Fungus favaginofus Park. Lob. Cat. Cant.*
Hift. 102.

Agaricus

est *Fungi* Genus pediculo destitutum; non lamellatum, horizontaliter plerumque ex arboribus aut lignis putridis nascens.

Agaricus pedis equini facie Tourn. Inst. 562.
Fungi arborei ad ellychnia. J. B. Cat. Cant. Hift.
 108.

Lycoperdon

est *Fungi* Genus pediculo nunc donatum, nunc destitutum: capite uniformi, sine Lamellis aut poris: substantia interiore in pulverem per maturitatem abeunte, & per medium foramen evolante.

Lycoperdon vulgare Tourn. Inst. 563. *Fungus pulverulentus dictus Crepitus Lupi. J. B. Cat. Cant. Hift.* 104.

GENUS III.

M U S C I

parvitate sua, vel substantia ficiore & minus succulenta, vel postquam fere exaruerint, immixtione in aquam facili reviviscentia, vel locis natalibus squalidis, ficcis, immodico frigore aut calore perustis, arboribus, lignis, petris, ubi aliae plantae vivere aut durare non possunt, vel denique fructum proferendi modo ab aliis plantis distinguuntur.

Conserva

est *Musci* Genus sterile, ex fibris capillaceis totum constans.

Conserva Plinii *Lob. Ludg. Ang. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 118.

Lichenoides

est *Musci* Genus peltatum.

Lichenoides arboreum capillaceum non tubulosum majus. *Muscus* arboreus *Trag. Dod. Math. Cat. Cant.* *Muscus* arboreus *Usnea* *Officinarum. C. B. Hist.* 114.

Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum *Dillen. Cat. Giss.* 204. *Muscus* pyxoides sive pyxidatus *Ger. Park. J. B. Cat. Cant. Hist.* 113.

Lichenoides peltatum arboreum maximum platyphyllum *Dillen. Cat. Giss.* 208. *Lichen* arborum *Ger. Cat. Cant.* *Muscus* arboreus pulmonarius. *C. B. Hist.* 116.

Hypnum

est *Musci* Genus, capitulis uniformibus, calyptratis donatum; pediculis e foliorum alis egredientibus, ad imam partem Involucro squamoso a foliis diverso cinctis.

Hypnum repens triangularibus foliis angustioribus *Dillen. Cat. Giss.* 219. *Muscus* terrestris vulgaris *Dod. Lob. Ger. Cat. Cant.*

Hypnum repens filicinum veluti spicatum *Dillen. Cat. Giss.* 217. *Muscus* filicinus *Ger. J. B. Park. filicinus* major *C. B. Fern Moss. In Kingston and Eversden*

Eversden Woods, and the Woods about Balsham. Cat. Cant. App.

Polytrichum

est *Musci* Genus, capitulis uniformibus, calyptra villosa tectis: cauliculis erectis, Involucro squamoso ad imam partem non cinctis.

Polytrichum Officinarum. Adiantum aureum majus Ger. Cat. Cant. Hist. 123.

Bryum

est *Musci* Genus, capitulis uniformibus, calyptra lævi tectis: cauliculis non repentibus, Involucro squamoso ad imam partem non cinctis.

Bryum capitulis reflexis piriformibus, calyptra quadrangulati foliis in bulbi formam congestis Dillen. Cat. Giff. 227. Adiantum aureum minus Tab. Lugd. Cat. Cant. Polytrichum aureum minus C. B. Park. Hist. 124.

Lichen

est *Musci* Genus floriferum & seminiferum; capitulis floridis polycoccis: feminibus in calyculis patulis, sessilibus contentis.

Lichen vulgaris Officinarum. Lichen five Hepatica vulgaris Park. Hist. 124. Lichen Math. Fuch. Dod. ut. Tur. Cat. Cant.

Lichen petraeus stellatus C. B. Hist. 125. Hepatica stellata Ger. Lichen five Hepatica minor stellaris Park. Star-beaded Liverwort. In glareosis umbrosis non infrequens. Cat. Cant. App.

Lichen petraeus umbellatus C. B. *Hist.* 125. *Hepatica umbellata* Ger. *Lichen* five *Hepatica minor umbellata* Park. *Small Ground Liverwort, with Round-heads. On the Moors.* Cat. Cant. App.

GENUS IV.

CAPILLARES

Semine minutissimo, pulvereo, foliis averfis innato a reliquis Plantis distinguuntur,

Phyllitis

est *Herba Capillaris*, folio simplici seminibus in lineis vermicularibus, a costa media ad extremitatem folii ductis.

Phyllitis Officinarum. *Phyllitis* Ger. *Hist.* 134. five *Lingua cervina* vulgi J. B. seu *Lingua cervina vulgaris* Park. *Lingua cervina Officinarum* C. B. *Harts-tongue. On Hinton Church.* Cat. Cant. App.

Polypodium

est *Herba Capillaris*, foliis in lacinias longas ad mediam fere costam pertingentes divisis; seminalibus exanthematis in duplicem macularum ordinem in unaquaque lacinia dispositis.

Polypodium Officinarum. *Polypodium* J. B. *Ger. Cat. Cant. Hist.* 137.

Filix mas

est *Herba Capillaris*, foliis alatis aut ramosis; exanthematis seminalibus in duplicem ordinem dispositis.

Filix

Filix mas Officinarum. Filix mas Ger. Matth. Fuch. Dot. ut. Tur. Lob. Cat. Cant. Filix mas vulgaris Park. Hist. 143.

Filix mas non ramosa pinnulis angustis raris profunde dentatis Ger. emac. Hist. 144. mollis sive glabra vulgari mari non ramosæ accedens J. B. Male Fern with thin-set deeply indented Leaves. In Gamlingay Park, and nigh the Park-pales. Cat. Cant. App.

Filix minor non ramosa J. B. Hist. 146. Filix palustris seu aquatica. Marsh or Water Male Fern. Filiei mari communi similis est sed plerunque minor, pallidior & sublutea, pinnulae quoque circum oras mimine sunt dentatae. With the former. Cat. Cant. App.

Filix ramosa minor J. B. Hist. 151. Dryopteris Tragi Ger. emac. Filix saxatilis sive ramosa nigris maculis notata C. B. pumila saxatilis prima Clusii Park. The lesser branched or female Fern. Observed by Mr. Dent on King's College-walls. Cat. Cant. App.

Filix foemina

est *Herba Capillaris*, foliis ramosis: exanthematis seminalibus foliorum marginibus circumcirca adnascens. tibus.

Filix foemina Cord. Ang. Fuch. Lob. Matth. Dod. Ger. Cat. Cant. Hist. 149.

Trichomanes

est *Herba Capillaris*, foliis pinnatis; pinnis subrotundis.

Trichomanes Park. Cat. Cant. Hist. 140.

Ruta muraria

est *Herba Capillaris*, foliis crassis, e pinnulis paucis, obtusis, compositis; colore fere rutaceo; pediculis viridibus, non nitentibus.

Ruta muraria Officinarum. *Adiantum album* Tab. Cam. Cat. Cant. Hist. 146.

Dryopteris

est *Herba Capillaris*, foliis multifariam divisis in segmenta angustiora, pediculis glabris, atronitentibus, seminalibus efflorescentiis in lineolis primo erumpentibus, quæ postea se diffundentes totam fere averfam foliorum superficiem occupant ferrugineæ pulverulentæ crustæ figura.

Dryopteris nigra Dod. *Adiantum nigrum* Officinarum J. B. Hist. 152. *Adiantum nigrum vulgare* Park. foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. *Onopteris mas* Ger. *Oak-fern*, or *black Maiden-hair*. On Ditton Church-walls, chiefly on the North-side, and on Hildertham Church. Cat. Cant. App.

Osmunda

est *Herba Capillaris* seminibus totam folii partem superiorem occupantibus, adeo ut valde diversa a cæteris folii partibus videatur.

Osmunda regalis Officinarum. *Filix florida* sive *Osmunda regalis* Ger. Hist. 151. *Osmunda regalis* sive *Filix florida* Park. *Filix ramosa* non dentata florida C. B. *Filix floribus insignis* J. B. *Water-fern*, or *Flowring-fern*, or *Osmund-royal*. Within Gamlingay

Gamlingay Park, and without by the Pales in the Corner next to Sandy. Cat. Cant. App.

Lonchitis

est *Herba Capillaris*, seminibus foliis innatis diversæ a reliquis formæ, quæ ab eadem radice proveniunt.

Lonchitis aspera Ger. Hist. 138. minor C. B. aspera minor Park. Matth. Cam. Ludg. altera folio Polypodii J. B. Rough Spleenwort. About Gamlingay. Cat. Cant. App.

Ophioglossum

est *Herba anomala Capillaribus affinis*, folio ab una radice unico; spica linguam serpentinam aliquo modo referente e medio folio, seu ex eodem cum folio pediculo exeunte.

Ophioglossum Officinarum, *Ophioglossum* Ger. Trag. Matth. Dod. Gesn. J. B. Cam. Cat. Cant. Hist. 126.

Lunaria

est *Herba anomala Capillaribus affinis*, foliorum pinnulis lunatis; seminibus in furculo peculiari.

Lunaria minor Ger. Park. Hist. 127. botrytis J. B. racemosa minor vel vulgaris C. B. Small Moonwort. Upon the same Hill where *Hypericum supinum* glabrum grows, as also in an old Gravel-pit, on the left Hand of the Road to Balsbam, about half a Mile from the Town.

Lenticula

Lenticula

est *Herba anomala Capillaribus affinis*, exigua, aquarum stagnantium superficiei innatans.

Lenticula palustris vulgaris C. B. Pin. 362. *Lens palustris* Ger. Matth. Dod. Lob. J. B. Lac. Cat. Cant. Hist. 117.

Lenticula aquatica trifulca J. B. C. B. Hist. 118. *Hederula aquatica* Lob. Ger. Cat. Cant.

PLANTÆ Ordinis Superioris sunt vel *Gemmiparæ*, vel non *Gemmiparæ*. Plantæ non *Gemmiparæ* *Herbæ* & *Suffrutices* dictæ sunt vel *Dicotyledones* vel *Monocotyledones*. *Herbæ* (quo nomine & *suffrutices* intelliguntur) *Dicotyledones* florem habent vel *petalodem* vel *apetalum*.

GENUS V.

HERBÆ FLORE APETALO.

Lupulus

est *Herba flore apetalo*; sexu diverso in diversis Plantis; foliis scabris, angulosis, adversis; caulibus volubilibus; floribus masculinis quinquepartitis; foemininis squamosis; squamis singulis singula semina, propemodum rotunda, & membranaceo tegmine seu calyptra involuta, occultantibus.

Lupulus Officinarum. *Lupulus* J. B. Clus. Trag. Dod. Matth. Cat. Cant. *Lupulus mas* & *foemina* J. B. Hist. 156.

Cannabis

Cannabis

est *Herba flore apetalò; sexu diverso in diversis Plantis: foliis digitatis: corticibus robustis, ad funes & linteamina texenda idoneis; feminibus in caulibus confertis, solitariis, calyptra seu involuero membranaceo in apicem desinente teclis.*

Cannabis Officinarum. Cannabis prima five sativa C. B. Cat. Cant. Hist. 158.

Urtica

est *Herba flore apetalò; sexu diverso in diversis Plantis; foliis simplicibus, serratis, adversis, tota superficie spinulis urentibus obsita.*

Urtica minor Ger. Cat. Cant. Hist. 161.

Urtica vulgaris urens Trag. Cat. Cant. Urtica major vulgaris J. B. Hist. 160.

Mercurialis

est *Herba flore apetalò; sexu diverso in diversis Plantis; foliis adversis; calycibus trifoliis in utroque sexu; fructu didymo.*

Mercurialis perennis, repens Cynocrambe dista Hist. 163. Cynocrambe mas & foemina Ger. emac. Cat. Cant.

Mercurialis mas & foemina Park. Hist. 163. mas & foemina J. B. Ger. Merc. 1. i. e. testiculata five mas Dioscoridis & Plinii C. B. item Merc. 2. i. e. bicata five foemina Diosc. & Plinii ejusd. French Mercury. In hortis inter olera & in timetis frequentissime occurrit. Cat. Cant. App.

Acetosa

Acetosa

est *Herba flore apétalo*; sexu diverso in diversis Plantis; calyce hexaphyllo: seminibus triquetris ad singulos flores singulis.

Acetosa arvensis Officinarum. *Acetosa arvensis lanceolata* C. B. *Cat. Cant. Hist.* 180.

Equisetum

est *Herba flore apétalo*; sexu diverso in diversis Plantis; foliis setaceis, per Gomphosin articulatis.

Equisetum arvense longioribus setis C. B. *Park. Cat. Cant. Hist.* 128.

Equisetum nudum Ger. *Cat. Cant. Hist.* 129.

Equisetum Officinarum. *Equisetum primum* Matth. *Lac. Cat. Cant. Equisetum majus* Ger. *Hist.* 128.

Dichotophyllon

est *Herba flore apétalo*, sexu diverso in eadem Planta; seminibus solitariis; foliis stellatim caulem ambientibus, in cornua quasi divisis.

Dichotophyllon Dillen. *Cat. Giff.* 149. *Equisetum palustre* ramosum aquis immersum, seu *Millefolium aquaticum* *equisetifolium* Cat. Cant.

Hippuris

est *Herba flore apétalo*, androgyno; seminibus ad singulos flores singulis, sessilibus: foliis simplicibus sine pediculis radiatim dispositis.

Hippuris

Hippuris foetida *Dillen. Cat. Giff.* 105. *Equisetum foetidum* sub aqua repens *C. B. J. B. Park. Cat. Cant. Hist.* 130.

Limnopeuce

est *Herba flore apetalo*, androgyno ; fructu ex ala folii pediculo innixo prodeunte, monospermo ; foliis simplicibus, integris sine pediculis radiatim dispositis.

Limnopeuce Cord. Hist. 150. *Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermon* *C. B. Cat. Cant. Hist.* 129.

Aponogeton

est *Herba flore apetalo*, androgyno ; fructu ex corniculis recurvis, tribus quatuorve simul in foliorum alis sessilibus constante.

Aponogeton aquaticum graminifolium flaminibus singularibus *Pont. Anth.* 117. *Potamogeto affine gramen aquaticum* *Cat. Cant. Potamogit. affinis graminifolia aquatica* *Hist.* 190.

Lapathum

est *Herba flore apetalo*, androgyno ; semine triquetro ; calyce hexaphyllo ; foliis tribus internis conniventibus, & semen maturum tegentibus.

Lapathum acutum *Officinarum. Lapathum acutum* *Ger. emac. Dod. Lob. Cat. Cant. Hist.* 175.

Lapathum folio acuto crispo *C. B. Hist.* 173. *acutum crispum* *J. B. acutum minus* *Park. acuti varietas folio crispo* *Ger. Sharp-pointed Dock with curled Leaves. In arvis frequens* *Cat. Cant. App.*

Lapathum

Lapathum folio acuto flore aureo C. B. *Hist.* 174. *anthoxanthon* J. B. *Golden Dock. In a Fen two miles from Ely called the North Fen.* Hujus semina exigua sunt & pallidiora quam reliquorum congenerum Cat. Cant. App.

Lapathum sylvestre folio minus acuto Ger. *emac.* Cat. Cant. *Lapathum vulgare folio obtuso* J. B. *Hist.* 175.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum J. B. *Hist.* 174. *Fiddle Dock. In Trinity and Caius College Courts among the Stones.* Cat. Cant. App.

Lapathum aquaticum folio cubitali C. B. Cat. Cant. *Lapathum maximum aquaticum sive Hydrolapathum* J. B. *Hist.* 171.

Lapathum aquaticum sive Hydrolapathum minus Ger. Cat. Cant.

Lapathum acetosum vulgare Syn. 143. *Acetosa vulgaris* Park. Cat. Cant. *Hist.* 178.

Fegopyron

est *Herba flore apetalò, androgyno; semine triquetro; floribus in spicis aut racemulis e foliorum alis egressis, speciosis; calycibus quinquepartitis; radicibus fibrosis.*

Fegopyron Dod. Park. Cat. Cant. *Hist.* 182.

Fegopyrum scandens sylvestre Syn. 144. *Convolvulus niger* Dod. Park. Cat. Cant. *Convolvulus minor Atriplicis folio* Park. *Hist.* 182.

Perficaria

est *Herba flore apetalò, androgyno; semine anguloso, non exacte triquetro, floribus in spicis summos caules & ramulos terminantibus; calycibus tetraphyllis*

raphyllis aut pentaphyllis ; radicibus fibrosis :
membrana ex adverso foliorum, sed præcipue ra-
mularum e sinibus foliorum egredientium, caulem
involvente.

Pericaria maculata Officinarum. *Pericaria* mi-
nis maculosa *Lob. Ger. Cat. Cant.* *Pericaria* macu-
losa *Ger. Hist.* 183.

Pericaria pulilla repens *Ger. emac. Park. Cat.*
Cant. Hist. 183.

Pericaria non maculata Officinarum. *Pericaria*
urens *Lob. Cat. Cant.* *Pericaria vulgaris* actris sive
Hydropiper *J. B. Hist.* 182.

Pericaria Salicis folio Potamogeiton angustifolium
dicta *Hist.* 184. *Potamogeiton angustifolium* *Ger.*
Cat. Cant.

Polygonum

est *Herba flore apetalo*, androgyno ; semine exacte
triquetro ; floribus in foliorum alis ; calycibus quin-
quepartitis : geniculis in caule crebris ; foliis par-
vis integris :

Polygonum Officinarum. *Polygonum mas* vulgare
Ger. Cat. Cant. Hist. 184.

Bistorta

est *Herba flore apetalo*, androgyno ; semine exacte
triquetro : floribus speciosis in spicis habitioribus,
summos caules terminantibus, quinquepartitis ; ra-
dicibus intortis & convolutis ; multis fibris capilla-
tis.

Bistorta Officinarum. *Bistorta major* *Ger. Cat.*
Cant. Hist. 186.

Potamogeiton

Potamogeton

est *Herba flore apetalo*, androgyno; seminibus angulosis, ad singulos flores quaternis: floribus in spicas digestis: calycibus quadrifoliis in aquis nascentes.

Potamogeton rotundifolium C. B. *Hist.* 188.
Potamogeton foliis latis splendentibus C. B. *Cat. Cant.*

Potamogeton aquis immersum folio pellucido lato oblongo acuto *Hist.* 188. *Potamogeton longis acutis foliis* Ger. *emac. Cat. Cant.*

Potamogeton seu *Fontalis media lucens* J. B. 3. 777. *Tribulus aquaticus minor Muscatellæ floribus* Ger. *emac. Cat. Cant.* *Fontalis media lucens* J. B. *Hist.* 189.

Potamogeton seu *Fontalis crispa* J. B. 3. 778. *Tribulus aquaticus minor Quercus floribus Clusii* Ger. *emac. Cat. Cant.* *Fontalis crispa* J. B. *Hist.* 189.

Potamogeton millefolium seu foliis gramineis ramosum *Hist.* 189. *Millefolium tenuifolium* Ger. *emac. Cat. Cant.*

Potamogeton perfoliatum P. B. *Cat. Cant. Hist.* 188.

Potamogeton ramosum caule compresso folio graminis canini *Cat. Cant. Hist.* 189.

Potamogeton pusillum gramineo folio caule rotundo *Cat. Cant. Hist.* 190.

Potamogeton foliis pennatis Tourn. *Inst.* 233. *Millefolium aquaticum pennatum spicatum* Park. C. B. *Cat. Cant. Hist.* 191.

Atriplex

Atriplex

est *Herba flore apetalo*, androgyno; seminibus rotundis, paululum compressis; quorum alia floribus succedunt; alia seorsim duabus valvulis conniventibus, ceu folliculo quodam includuntur.

Atriplex sylvestris folio hastato seu deltoide *Hist.*

192. *Atriplex sylvestris altera* C. B. *Ger. emac. Cat. Cant.*

Atriplex sylvestris angustifolia *Park. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 192.

Chenopodium

est *Herba flore apetalo*, androgyno; seminibus rotundis solitariis, calycibus inclusis quinquepartitis.

Chenopodium foetidum *Tourn. Inst.* 506. *Atriplex olida* *Ger. Cat. Cant. Hist.* 198.

Chenopodium folio sinuato candicante *Tourn. Inst.* 506. *Atriplex sylvestris* *J. B. Cat. Cant. Hist.* 197.

Chenopodium Pes anserinus *J. Tabern. Tourn. Inst.* 506. *Atriplex sylvestris latifolia* *Lob. Cat. Cant. Hist.* 198.

Chenopodium Pes anserinus *ij Tabern. Tourn. Inst.* 506. *Atriplex sylvestris latifolia altera* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 197.

Chenopodium folio triangulo *Tourn. Inst.* 506. *Bonus Henricus* *J. B. Tab. Ger. Trag. Matth. Cat. Cant.* *Blitum Bonus Henricus dictum* *Hist.* 195.

Blitum

est *Herba flore apetalo*, androgyno; semine non anguloso:

guloſo : calycibus in tres partes profunde diviſis, veſicarum formam aſſumentibus & ſemina ſolitaria includentibus.

Blitum rubrum minus *J. B. C. B. Ger. emac. Cat. Cant. Hiſt.* 200.

Parietaria

eſt *Herba flore apetalo*, androgyno ; ſeminibus non anguloſis nudis : floribus in foliorum alis confertis.

Parietaria Officinarum. Parietaria Ger. J. B. Cat. Cant. Hiſt. 206.

Alchimilla

eſt *Herba flore apetalo*, androgyno ; ſeminibus non anguloſis nudis : calycibus in octo ſegmenta diviſis.

Alchimilla Officinarum. Alchimilla Ger. Hiſt. 208. *Alchimilla vulgaris C. B. major vulgaris Park. Pes leonis ſive Alchimilla J. B. Ladies Mantle. Abundantly in ſome Paſtures about Baſham and Gamlingay. Cat. Cant. App.*

Percepier

eſt *Herba flore apetalo*, androgyno ; ſeminibus non anguloſis nudis, in ſingulis calycibus ſingulis : floribus in foliorum alis ; calycibus quadripartitis.

Percepier Anglorum Lob. Ger. emac. Cat. Cant. Hiſt. 209.

Knawel

eſt *Herba flore apetalo*, androgyno ; ſeminibus non anguloſis,

angulosis, nudis : floribus in caulium & ramulorum
 divaricationibus, inque summis ramulis ; calycibus
 cellatis, in quinque acuta segmenta divis. *Cat.*

Knawel *Trag.* 393. Polygonum exiguum *Dod.*
Cat. Cant. Polygonum Germanicum vel Knawel
 Germanorum *Park. Hist.* 213.

Knawel montanum calyce specioso lacteo *Dillen.*
Syn. Stirp. Brit. 202. Linaria adulterina *Tab. Ger.*
mac. Cat. Cant. Hist. 399.

Hoc loco adjici possunt Herbæ quædam *Apetalis*
affines, floribus scilicet staminosis ; petalis vix con-
spicuis.

Plantago

Herba apetalis affinis ; floribus staminosis, in spi-
ras congestis : valculis seminalibus ellipticis, per
maturitatem horizontali sectione in medio diffilen-
tibus.

Plantago latifolia Officinarum. Plantago latifo-
lia vulgaris Park. Cat. Cant. Hist. 876.

Plantago incana Ger. Cat. Cant. Hist. 877.

Plantago major panicula sparsa J. B. Cat. Cant.
Hist. 877.

Plantago angustifolia Officinarum. Plantago
inquenervia Ad. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 877.

Plantago foliis laciniatis Coronopus dicta Syn.
15. Coronopus Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Ad.
Tab. Cat. Cant. Coronopus vulgaris sive Cornu cer-
uinum Park. Hist. 879.

Sanguisorba

Herba apetalis affinis ; floribus staminosis, in spi-
ras crassas congestis ; seminibus quadratis : foliis
innatis.

Sanguisorba Officinarum. Pimpinella vulgaris
five minor *Park. Cat. Cant. Hist.* 401.

Sanguisorba major flore spadiceo J. B. 3. 120.
Pimpinella sylvestris Ger. Cat. Cant. Hist. 402.

Reseda

est *Herba apetalis affinis; floribus staminosis: vas-*
culis oblongis, triangulis, perpetuo hiantibus, sex
seminum ordines continentibus.

Reseda vulgaris C. B. Cat. Cant. Hist. 1053.

Luteola

est *Herba apetalis affinis; floribus staminosis: vascu-*
lo brevi, in tres carinas antequam semen maturef-
cat dehiscente, quarum unaquæque duos seminum
ordines continet.

Luteola Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 1054.

Thalictrum

est *Herba apetalis affinis; floribus staminosis: semi-*
nibus ad singulos flores singulis, striatis.

Thalictrum sive Thaliectrum majus Ger. Cat. Cant.
Hist. 403.

Thalictrum minus Ger. Park. Dod. Cat. Cant Hist.
404.

HERBÆ Dicotyledones flore petalode eundem ha-
bent vel compositum vel simplicem. Flores compositi
Flosculis componuntur vel irregularibus solis seu di-
midatis; vel regularibus, aut solis, aut irregula-
rium radio cinctis.

GENUS

GENUS VI.

HERBAE PLANIPETALAE LACTE-
SCENTES seu *mavis* CICHORACEAE

floribus ex *Flosculis dimidiatis* (*Semiflosculis* dictis)
compositis a cæteris distinguuntur.

Lactuca

est *Herba cichoracea*, seminibus brevibus, latiusculis
& compressis, utrinque acuminatis, pappo piloso
pediculo donato coronatis, capitulis parvis gracili-
bus, oblongis calycibus squamosis septis.

Lactuca sylvestris costa spinosa C. B. Cat. Cant.
Hist. 222.

Lactuca sylvestris major odore Opli Ger. emac.
Hist. 221. *Lactuca sylvestris* 2. Ger. emac. Cat.
Cant.

Lactuca sylvestris laciniata minima Cat. Cant.
Chondrilla viscosa humilis C. B. Hist. 222.

Sonchus

est *Herba cichoracea*, seminibus compressis pappo
piloso immediate coronatis, capitulis grandioribus,
postquam defloruerunt, figuram conicam assumen-
tibus.

Sonchus asper Officinarum. *Sonchus asper* laci-
niatus & non laciniatus C. B. Cat. Cant. Hist. 223.

Sonchus laevis Officinarum. *Sonchus laevis* Ger.
Cat. Cant. Hist. 224.

Sonchus repens multis *Hieracium* majus J. B.
Cat. Cant. Hist. 226.

Hieracium

est *Herba cichoracea*, caule ramoso, seminibus cylindraceis vel conî inversi figuram referentibus, striatis, pappo piloso coronatis: calyce squamoso.

Hieracium asperum majori flore in agrorum limitibus *J. B. Cat. Cant. Hist.* 233.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum *Park. C. B. Hist.* 238. *Hieracii sabaudi* varietas altera *J. B. Bushy Hawkweed with rough broad Leaves. Cat. Cant. App.*

Hieracium fruticosum latifolium glabrum *Park. Hist.* 238. frut. latif. foliis dentatis glabrum *C. B. Hieracii sabaudi* varietas I. *Erinus* quibusdam *Matth.* dicta *J. B. The smaller broad-leav'd bushy Hawkweed.* Inter hoc & præcedens manifesta est differentia; Illud enim foliis est & caulibus molli lanugine pubescentibus, hoc brevi & vix conspicua lanugine obducitur, deinde illud serius floret, hoc maturius. *Parkinsono* male describitur. *Cat. Cant. App.*

Hieracium fruticosum angustifolium majus *C. B. Park. Hist.* 238. intybaceum *Ger.* rectum rigidum quibusdam *Sabaudum. J. B. Narrow-leav'd bushy Hawkweed. These three last in Gamlingay Park, and on the Sides of the great Road beyond the Park. Cat. Cant. App.*

Hieracium primum latifolium *Clusii Ger. Hist.* 239. *Hieracium montanum* caule aphylo non ramoso flore pallidiore. *Mountain Hawkweed with a pale Flower. On Gogmagog-hills and Newmarket-beath. Cat. Cant. App.*

Hieracium murorum folio pilosissimo *C. B. Hist.* 239. *Pulmonaria Gallica* sive aurea latifolia *Ger. Hieracium murorum Bauhini* quod est *Pulmonaria Gallorum*

Gallorum Lobelii Park. Pilosella major quibusdam aliis Pulmonaria flore luteo J. B. French or Golden Lungwort. About Gamlingay. Cat. Cant. App.

Pilosella

est *Herba cichoracea*, flagellis reptatricibus se propagans; caule nudo, simplici, unicum florem in fastigio gestante; calyce ligulis donato: seminibus cylindraceis, striatis; pappo piloso coronatis.

Pilosella repens Ger. Cat. Cant. Hist. 242.

Hieracioides

est *Herba cichoracea*, caule ramoso seminibus fusiformibus, striatis, pappo piloso coronatis: calyce striato.

Hieracioides vulgarissima, pene glabra, annua, folio longo dentato Vaill. Mem. Acad. 1721. Hieracium luteum glabrum sive minus hirsutum J. B. Cat. Cant. Hist. 234.

Hieracioides vulgaris foetida Vaill. Mem. Acad. 1721. Hieracium minus Cichorei vel potius Stæbes folio hirsutum Cat. Cant. Hieracium Castorei odore Monspeliensium Hist. 232.

Dens leonis

est *Herba cichoracea*, caule nudo, simplici, unicum florem in fastigio gestante: calyce squamoso: seminibus pappo piloso coronatis.

Dens leonis Ger. Cat. Cant. Hist. 244.

Taraxaconoides

est *Herba cichoracea*, caule nudo, simplici, unicum florem in fastigio gestante: calyce ligulis donato: seminibus fusiformibus, pappo piloso coronatis.

Taraxaconoides perennis & vulgaris *Vaill. Mem. Acad.* 1721. Hieracium caule aphylo hirsutum *J. B. Cat. Cant. Hist.* 245.

Scorzonera

est *Herba cichoracea*, caulibus ramosis: calyce squamoso: seminibus fusiformibus, pappo plumoso coronatis.

Scorzonera folio laciniato, radice succisa. Hieracium minus præmorsa radice *Lob. ic. Park. Cat. Cant.* Hieracium minus præmorsa radice sive Fuchsi *J. B. Hist.* 230.

Hypochaeris

est *Herba cichoracea*, caule ramosa: calyce squamoso: seminibus fusiformibus; pappo plumoso coronatis: placenta glumis ornata.

Hypochaeris vulgaris major *Vaill. Mem. Acad.* 1721. Hieracium longius radiculatum *Lob. Ger. emac. Park. Cat. Cant. Hist.* 230.

Helminthotheca

est *Herba cichoracea*, caule ramoso: calyce striato, perianthio testato: seminibus annulis seu rugis transversis ornatis; pappo plumoso coronatis.

Helminthotheca hispida, vulgaris, annua *Vaill. Mem. Acad.* 1721. Buglossam luteum *Ger. Cam. Cat. Cant.* Hieracium echioides capitalis *Car. du. benedicti C. B. Hist.* 233.

Tragopogon

est *Herba cichoracea*, caule ramoso: calyce simplici: seminibus fusiformibus; pappo plumoso coronatis: foliis gramineis.

Tragopogon luteum *Ger. Cat. Cant. Hist.* 252.

Cichorium

Cichorium

est *Herba cichoracea*, caule ramoso : floribus e lateribus caulium & ramorum egredientibus : calycibus duplicibus : seminibus angulosis, ora membranacea summa parte ornatis : placenta glumis donata.

Cichorium sylvestre Officinarum. *Cichorium* Ger. emac. Cat. Cant. *Cichorium sylvestre* & sativum J. B. Hist. 255.

Lampisana

est *Herba cichoracea*, caule ramoso : calyce simplici ; seminibus non papposis.

Lampisana Lob. Ger. emac. Cam. Dod. Thal. Cat. Cant. *Lampisana Dodonæi* J. B. Hist. 256.

Lampisana minor aphyllocaulos Vaill. Mem. Acad. 1721. *Hieracium minimum* Clusii Hyoseris Tabernæmontani & Gerardi Park. Cat. Cant. Hist. 227.

GENUS VII.

HERBAE FLORE DISCOIDE, SEMINE
PAPPOSO.

Tussilago

est *Herba flore discoide*, radiato ; semine pappo piloso coronato : calyce in plures partes ad basin usque fisso : floribus in singulis caulibus singulis.

Tussilago Officinarum. *Tussilago* Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Ger. J. B. Park. Cat. Cant. Hist. 159.

Jacobaea

Jacobæa

est *Herba flore discoide*, radiato; *semine pappo* piloso coronato: calyce simplici cylindrico, in plures partes ad basin usque fisso: caulibus ramosis.

Jacobæa Ger. Cat. Cant. *Jacobæa vulgaris* *J. B. Hist.* 284.

Jacobæa latifolia palustris sive *aquatica* *Hist.* 285.
Jacobæa latifolia Ger. emac. Cat. Cant.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non lacinata *C. B. Cat. Cant.* *Jacobæa montana* non lacinata nostras *Hist.* 272.

Jacobæa incana viscosa annua Senecionis folio *Vaill. Mem. Acad.* 1721. *Senecio hirsutus viscidus* major odoratus *J. B. Cat. Cant. Hist.* 290.

Jacobæa palustris altissima foliis serratis *Tourn. Inst.* 485. *Conyza palustris* *Park. Cat. Cant.* *Virgæ aureæ* sive *Solidagini angustifoliæ* affinis *Lingua avis Dalechampii* *J. B. Hist.* 280.

Jacobæa Senecionis folio incano perennis *Hist.* 285. *Perennial Ragwort with ground-sel Leaves.* In aggeribus sepium & dumetis passim *Cat. Cant. App.*

Aster

est *Herba flore discoide*, radiato; *semine pappo* piloso coronato: calyce squamoso, expanso: caulibus ramosis: floribus caulem & ramulos terminantibus.

Aster omnium maximus Helenium dictus *Tourn. Inst.* 482. *Enula campana offic.* *Cam. Park. Cat. Cant.* *Helenium Ger. Hist.* 273.

Aster arvensis cæruleus acris *Tourn. Inst.* 481. *Conyza cærulea acris* *C. B. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 270.

Aster

After maritimus purpureus Tripolium dictus
Hist. 270. Tripolium majus & minus J. B. Cat.
Cant.

After pratensis autumnalis Conyzæ folio Tourn.
Inst. 482 Conyza media Matth. Ger. Dod. Ad.
Lob. Cat. Cant. Hist. 262.

After palustris laciniatus luteus Tourn. Inst. 483.
Conyza foliis laciniatis Ger. emac. Cat. Cant. Hist.
264.

After palustris paryo flore globoso Tourn. Inst.
483. Conyza minor Trag. Matth. Cat. Cant. Hist.
262.

Virga aurea

est Herba flore discoide, radiato; semine pappo pilo-
so coronato: calyce squamoso, expanso; caulibus
ramosis: floribus in spicas secundum caules & ra-
mulos excurrentibus.

Virga aurea Officinarum. Virga aurea Ger.
Hist. 278. aurea vulgaris Park. aurea vulgaris lati-
folia J. B. aurea 4. sive angustifolia minus serrata
C. B. Golden-rod. In the Park and some Pastures
about Gamlingay.

Filago

est Herba flore discoide, nudo; semine pappo piloso
coronato: floribus conglobatis.

Filago seu Impia Dod. Gnaphalium minus sive
Herba impia Park. Cat. Cant. Gnaphalium vulgare
majus C. B. Hist. 295.

Filago altera Dod. Gnaphalium Anglicum Ger.
Hist. 295. anglicum vulgare majus Park. majus an-
gusto oblongo folio alterum C. B. rectum J. B.
Great English Cudweed. In the Pastures about Gam-
lingay and in the Park. Cat. Cant. App.

Filago

Filago minor Ger. *emar.* 641. *Gnaphalium minimum* J. B. *Cat. Cant. Hist.* 296.

Elichrysium

est *Herba flore discoide, nudo; semine papposo: floribus non conglobatis; calycibus squamosis, lucidis, coloratis.*

Elichrysium montanum flore rotundiore *Tourn. Inst.* 453. *Gnaphalium montanum album* *Lob. ico. Tab. Ger. Cat. Cant. Hist.* 283.

Conyza

est *Herba flore discoide, nudo; semine pappo piloso coronato: calyce squamoso; cylindrico, gracili: foliis alternis.*

Conyza major *Matth. Cat. Cant.* *Conyza major vulgaris* C. B. *Hist.* 292.

Eupatorium

est *Herba flore discoide, nudo; semine papposo: calyce squamoso, cylindrico; habitiore: foliis ad- versis*

Eupatorium cannabinum *Officinarium.* *Eupatorium cannabinum* *Park. C. B. Cat. Cant. Hist.* 293.

Petasites

est *Herba flore discoide, nudo; semine pappo piloso coronato: calyce squamoso cylindrico: floribus in spicam dispositis.*

Petasites Officinarium. *Petasites vulgaris* *Park. Cat. Cant.* *Petasites* *Ger. Hist.* 260.

Senecio

est *Herba flore discoide, nudo; semine pappo piloso coronato: calyce simplici, cylindrico, ad basin usque fissio: foliis alternis.*

Senecio

Senecio Officinarum. Senecio vulgaris *Park. Cat. Cant. Hist.* 290.

GENUS VIII.

HERBAE CORYMBIFERAE

Floribus discoideis; seminibus non papposis distinguuntur.

Bellis

est *Herba corymbifera*, flore radiato; placenta nuda; calyce simplici, ad basin usque diviso: caule nudo, simplici, unicum florem in fastigio gestante.

Bellis minor Officinarum. Bellis minor sylvestris simplex Park. Cat. Cant. Bellis sylvestris minor C. B. Hist. 349.

Matricaria

est *Herba corymbifera*, flore radiato; placenta nuda; calyce squamoso; seminibus striatis; caulibus ramosis.

Matricaria Officinarum. Matricaria Ger. Hist. 357. *Parthenium Matth. Dod. gal. Lac. Cord. Cat. Cant.*

Matricaria vulgaris flore amplo folio serrato. *Bellis major L. B. Ger. Dod. Matth. Trag. Fuch. Lob. Cat. Cant. Hist.* 350.

Matricaria folio minus secto glauco flore luteo Vaill Mem. Acad. 1720. *Chrysanthemum segetum Lob. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 339.

Chamæmelum

est *Herba corymbifera*, flore radiato; placenta glumis ornata; calyce squamoso: caulibus ramosis.

Chamæmelum

Chamæmelum foetidum C. B. Pin. 135. *Cotula foetida* Lob. Park. Ger. Cat. Cant. Hist. 355.

Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. *Cotula non foetida* Park. Ger. Cat. Cant.

Millefolium

est *Herba corymbifera*, flore radiato; placenta glumis ornata; calyce squamoso: floribus quasi in umbellis.

Millefolium Officinarium. *Millefolium vulgare* Park. Hist. 345. Cat. Cant.

Millefolium pratense folio serrato. *Ptarmica* Ger. Matth. Fuch. Lob. Cat. Cant. Hist. 344.

Bidens

est *Herba corymbifera*, flore nudo; placenta glumis ornata; calyce simplici aut duplici, ad basin usque fissi; seminibus duobus aut pluribus cornibus in summitate donatis: caulibus ramosis: foliis digitatis.

Bidens foliis tripartito divis Ces. 12. 17. *Eupatorium cannabinum* foemina Ger. Cat. Cant. Hist. 360.

Bidens folio non dissecto Ces. 12. 17. *Eupatorium aquaticum* folio integro Park. Cat. Cant. Hist. 361.

Tanacetum

est *Herba corymbifera*, flore nudo; placenta nuda; calyce squamoso: floribus in summis caulibus umbellatim dispositis.

Tanacetum Officinarium. *Tanacetum* Ger. Cat. Cant. Hist. 365.

Absinthium

Absinthium

est *Herba corymbifera*, flore nudo; placenta nuda; calyce squamoso, hemisphærico: floribus in thyrso pendulis.

Absinthium vulgare *Officinarum*. *Absinthium* vulgare *Park. Trag. Lob. Gesn. Cat. Cant. Hist.* 366.

Artemisia

est *Herba corymbifera*, flore nudo; placenta nuda; calyce squamoso: floribus in thyrso erectis.

Artemisia *Officinarum*. *Artemisia* *Trag. Aug. Matth. Cord. in Diosc. Cat. Cant. Artemisia vulgaris* *J. B. Park. Hist.* 372.

GENUS IX.

HERBAE CAPITATAE

Floribus e flosculis fistulosis in longas plerumque lacinias divisis compositis; calycibus, a flore præcipue delapso, in ventrem squamosum capitis æmulum extumescensibus distinguuntur.

Carduus

est *Herba capitata*, calycis squamis in spinam abeuntibus; placenta glumis ornata: seminibus pappo piloso coronatis: foliis spinosis.

Carduus tomentosus *Acanthium* dictus vulgaris *Syn.* 196. *Acanthium* *Matth. Dod. ut. Ad. Lob. Cam. Cat. Cant.* *Acanthium* vulgare *Park. Hist.* 313.

Carduus nutans *J. B. Cat. Cant. Hist.* 308.

Carduus caule crispo *J. B.* 3. 59. *Carduus polyacanthos* *Park. Hist.* 309. *Carduus polyacanthos primus* *Ger. emac.* *Aculeosa Gazæ Ad. Polyacantha*

tha *Tab. ex sententia Johnsoni. Thistle upon Thistle.*
In aggeribus fossarum & inter vepres *Cat. Cant.*
App.

Carduus spinosissimus capitulis minoribus P. B.
Carduus polyacanthos secundus Ger. emac. Hist.
309. *Wetted Thistle with small Flowers.*

Lappa

est *Herba capitata*, calycis squamis hamatis; placenta glumis ornata; seminibus striatis pappo piloso coronatis.

Lappa major Arcium Dioscoridis C. B. Pin. 198.
Bardana major Ger. Cat. Cant. Hist. 332.

Lappa major montana capitulis tomentosis five
Arcium Dioscoridis C. B. Pin. 198. Bardana ma-
ior altera Ger. Hist. 332. major lanuginosis capi-
tulis Park. Personata altera cum capitulis villosis
J. B. Lappa major montana capitulis tomentosis
five Arcium C. B. Woolly-headed Burdock. In King-
ston-wood. Cat. Cant. App.

Cirsium

est *Herba capitata*, calycis squamis in spinulam mollem, innocuam terminatis; placenta glumis ornata; seminibus oblongis; pappo plumoso coronatis.

Cirsium Britannicum Clusii repens J. B. Hist. 306.
Cirsium Anglicum primum, & Cirsium Ang. aliud
Park. Cat. Cant.

Cirsium acaulos flore purpureo Tourn. Inst. 448.
Carduus acaulis Lob. Cat. Cant. Carlina acaulos mi-
nore purpureo flore C. B. Hist. 310.

Cirsium pratense polycephalon vulgare Tourn.
Inst. 448. Carduus caule crispo J. B. Cat. Cant.
Carduus palustris C. B. Park. Hist. 309.

Cirsium

Cirsium arvense Sonchi folio radice repente
Tourn. Inst. 448 *Carduus vulgarissimus viarum* Ger.
Cat. Cant. Hist. 310.

Eriocephalus

est *Herba capitata*, calycis squamis in spinam abeuntibus; lanugine intertextis; placenta glumis ornata: seminibus oblongis pappo plumoso coronatis.

Eriocephalus capite rotundo maximo *Vaill. Mem. Acad.* 1718. *Carduus* capite tomentoso *J. B. Cat. Cant.* *Carduus tomentosus* Corona fratrum dictus *Park. Hist.* 311.

Eriocephalus vulgaris capite turbinato flore purpureo *Vaill. Mem. Acad.* 1718. *Carduus lanceatus* Ger. *Cat. Cant. Hist.* 310.

Calcitrapa

est *Herba capitata*, calycis squamis in spinam ramosam abeuntibus; placenta glumis ornata: seminibus pappo piloso coronatis.

Calcitrapa vulgaris foliis laciniatis. *Carduus stellatus* Ger. *Dod. Cat. Cant. Hist.* 317.

Silybum

est *Herba capitata*, calycis squamis in folium spinosum terminatis; placenta glumis ornata: seminibus ovatis, compressis, nudis.

Silybum albis maculis notatum *Vaill. Mem. Acad.* 1718. *Carduus lacteus* *Matth. Lugd. Cat. Cant.* *Carduus Mariæ* Ger. *Hist.* 312.

Carlina

est *Herba capitata*, calycis squamis in folium spinosum desinentibus; squamis superioribus integris, coloratis

coloratis radium mentitis : placenta glumis ornata : seminibus villosis, pappo plumoso coronatis.

Carlina sylvestris quibusdam aliis *Atractylis* *J. B. Cat. Cant. Hist.* 288.

Serratula

est *Herba capitata*, calycis squamis non spinosis integris ; placenta glumis ornata : seminibus pappo piloso coronatis.

Serratula *J. B. C. B. Lob. Matth. Dod. Cat. Cant. Hist.* 331.

Jacea

est *Herba capitata*, calycis squamis ciliis instar pilosis ; placenta glumis ornata : seminibus aut nudis, aut pappo piloso coronatis.

Jacea nigra vulgaris *Park. Cat. Cant. Hist.* 325.

Jacea major *Ger. Hist.* 325. *Jacea segetum major purpurea* *P. B. Cat. Cant.*

Cyanus

est *Herba capitata*, flore coronato ; flosculis corollam constituentibus minus profunde dissectis, ore in latum expanso ; calycis squamis ciliis instar pilosis ; placenta glumis ornata.

Cyanus minor *Officinarum. Cyanus* *J. B. Tur. Gesn. hort. Cat. Cant. Hist.* 321.

Hiscæ subjunguntur *Herbæ* quædam anomalæ *corymbiferis affines* dictæ ; quæ inter flores compositos & simplices ambigere videntur. Quamvis enim plures flores habent exiguos communi placentæ affixos, in eo tamen a floribus compositis differunt quod staminibus apicibusque ut in floribus simplicibus donantur.

Scabiosa

Scabiosa

est *Herba corymbiferis affinis*, floribus discum referentibus; communi calyce cinctis; singulis etiam calyce privato donatis.

Scabiosa Officinarum. *Scabiosa major vulgaris* *Dod. Lugd. Ger. Cat. Cant.* *Scabiosa major communior hirsuta folio laciniato* *J. B. Hist.* 374.

Scabiosa minor vulgaris *J. B. Hist.* 374. *Scabiosa minor five columbaria* *Ger. Cat. Cant.*

Scabiosa folio integro *Ces.* 13. 59. *Succisa five Morsus Diaboli* *J. B. Hist.* 380. *Morsus Diaboli* *Trag. Gesn. Ad. Lob. Cam. Tab. Ger. Cat. Cant.*

Dipsacus

est *Herba corymbiferis affinis*, floribus congestis in caput magnum, oblongum, foliis oblongis ad basin cinctum, multis foliolis in alveum flexis sinu suo flores continentibus, *compositum*.

Dipsacus sylvestris Officinarum. *Dipsacus* *Lac. Lon. Tab. Cat. Cant.* *Dipsacus sylvestris five Labrum Veneris* *J. B. Hist.* 382.

Dipsacus minor *Gesn. hort. Thal. Cat. Cant.* *Dipsacus minor five Virga pastoris* *Ger. emac. Hist.* 382.

Herbae Dicotyledones flore petalode simplici Semina habent vel *nuda* vel *vasculis inclusa*. *Semina nuda* singulis floribus succedunt vel *singula*, vel *bina*, vel *quaterna*, vel *plura*.

GENUS X.

HERBAE GYMNOMONOSPERMAE.

Valeriana

est *Herba gymnomonosperma*, foliis adversis: floribus androgynis, monopetalis, tubulosis, ad oras quinquefidis: seminibus papposis.

Valeriana sylvestris major *Ger. Cat. Cant. Hist.* 388.

Valerianastrum

est *Herba gymnomonosperma*, sexu diversa in diversis plantis: foliis adversis: floribus monopetalis, tubulosis, ad oras quinquefidis: seminibus papposis.

- *Valerianastrum* palustre vulgare. *Valeriana sylvestris* minor *Park. Lob. Ger. Cat. Cant.* *Valeriana* minor *Ger. Hist.* 388.

Valerianella

est *Herba gymnomonosperma*, caulibus, dichotomis: floribus monopetalis, infundibuliformibus: seminibus non papposis.

Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso *Mor. Umb. Lactuca agnina* *Ger. Park. Cat. Cant.* *Valeriana campestris* inodora major *C. B. Hist.* 392.

Agrimonia

est *Herba gymnomonosperma*, seminibus lappaceis: foliis pinnatis.

Agrimonia *Officinarum.* *Agrimonia* *Ger. Officin. Cat. Cant. Hist.* 400.

Fumaria

Fumaria

est *Herba gymnomonosperma*, floribus spicatis, ad papilionaceos accedentibus, in calcar quoddam retrosum productis, pediculo e media parte egresso hærentibus.

Fumaria Officinarum. Fumaria Trag. Matth. Fuch. Dod. Cat. Cant. Fumaria vulgaris J. B. Hist.
404.

Fumaria major scandens flore pallidiore Hist.
405. *The greater ramping Fumitory. In the Corn upon the Borders of Gogmagog-hills towards Hinton Moor.* Hæc omnibus suis partibus major est quam vulgaris. Flos incarnatus, media parte intense rubra. Foliorum pediculis vicinas stirpes apprehendit (nam viticulos seu claviculas non habet) alias humi provolvitur *Cat. Cant. App.*

GENUS XI.

HERBAE UMBELLIFERAE seu *mavis*
FERULACEAE

Floribus pentapetalis : seminibus ad singulos flores binis a reliquis distinguuntur.

Sphondylium

est *Herba ferulacea*, semine compresso, ala foliacea cincto, summa parte bifido, dorso striato, interiore superficie, ubi bina se mutuo tangunt, duabus lineis nigris radiato : petalis albis bifidis & velut cornutis ; exterioriore reliquis multo majore : foliis latis compositis.

Sphondylium Ad. Lob. Dod. Ger. Cat. Cant. Hist.
408.

Sphondylium majus aliud *laciniatis foliis* *Park. Hist.* 408. *Jagged Cow-Parsnep. In Kingston-wood. Cat. Cant. App.*

Pastinaca

est *Herba ferulacea*, seminibus compressis, ala foliacea cinctis: petalis luteis: foliis latis compositis.

Pastinaca sativa *Trag. Lugd. Gesn. hort. Cam. Cat. Cant.* *Pastinaca latifolia sativa* *Ger. Park. C. B. Hist.* 410.

Pastinaca sylvestris latifolia *C. B. Hist.* 409. *Elaphoboscum* *Matth. Dod. gal. Cast. Cat. Cant.*

Scandix

est *Herba ferulacea*, seminibus rostratis: petalis indivisis, subrotundis; exteriori reliquis productiore: foliis compositis: *Umbella simplici.*

Scandix semine rostrato vulgaris *C. B. Pin.* 152. *Pecten Veneris* *J. B. Ad. Lob. Cat. Cant. Hist.* 428.

Chærophyllo

est *Herba ferulacea*; seminibus longis, angustis, lævibus: foliis tenuiter dissectis: petalis inæqualibus.

Chærophyllo sylvestre perenne *Cicutæ folio* *Tourn. Inst.* 314. *Cicutaria vulgaris* *J. B. Cat. Cant. Hist.* 429.

Myrrhis

est *Herba ferulacea*, seminibus longis, angustis, striatis: petalis inæqualibus: foliis tenuiter divisiss.

Myrrhis annua semine striato lævi *Mor. Umb.* 44. *Cereseolum sylvestre* *Tab. Ger. Cat. Cant. Hist.* 431.

Podagraria

Podagraria

est *Herba ferulacea*, seminibus mediæ longitudinis & crassitie, friatis; petalis inæqualibus, bifidis & reflexis: foliis compositis.

Podagraria vulgaris Park. 943. *Angelica sylvestris minor hort. Hafn. Cat. Cant.* *Angelica sylvestris minor sive erratica* C. B. *Hist.* 435.

Bulbocastanum

est *Herba ferulacea*, seminibus parvis, angustis; foliis tenuiter divisis: radice tuberosa.

Bulbocastanum J. B. *Cat. Cant. Hist.* 440.

Oenanthe

est *Herba ferulacea*, seminibus parvis, angustis; summa parte cuspidibus quibusdam donatis: petalis inæqualibus, bifidis: radicibus tuberosis foliis compositis.

Oenanthe aquatica C. B. *Cat. Cant. Hist.* 441.

Sium

est *Herba ferulacea*, seminibus parvis, angustis: petalis æqualibus, bifidis: foliis compositis.

Sium quod *Amomum vulgare* *Officinarum*. *Sison* sive *Officinarum Amomum* J. B. *Cat. Cant. Hist.* 443.

Sium Officinarum. *Sium majus latifolium* Ger. *Cat. Cant. Hist.* 443.

Sium erectum umbellatum sive *Pastinaca aquatica* Lob. *Cat. Cant. Hist.* 444.

Sium umbellatum repens Ger. *emac. Cat. Cant. Hist.* 444.

Sium arvense sive *segetum* Tourn. *Inst.* 308. *Selinum Sii foliis* Ger. *emac. Hist.* 443. *segetale* Park.

Honewort. On a Bank on the left Hand in the Road to Madingley, as soon as you are out of Cambridge, and on many other Ditch-banks about Cambridge Cat. Cant. App.

Pimpinella saxifraga

est *Herba ferulacea*, seminibus parvis angustis: petalis inæqualibus, bifidis: foliis compositis.

Pimpinella saxifraga Officinarum. *Pimpinella saxifraga* major altera C. B. Cat. Cant. *Pimpinella saxifraga* minor, foliis Sanguisorbæ Hist. 445.

Pimpinella saxifraga hircina major Park. Cat. Cant. *Pimpinella saxifraga* Ger. Hist. 445.

Pimpinella saxifraga minor C. B. Cat. Cant. Hist. 445.

Carum

est *Herba ferulacea*, seminibus oblongis, angustis, striatis: foliis pinnatis, pinnis in multas lacinias dissectis & sine pediculis adnexis.

Carum Officinarum. *Carum* sive *Careum* Ger. Hist. 446. *Carum* vulgare Park. Caros J. B. Cuminum pratense Carui Officinarum C. B. Carawaies. In Christ's College-piece, In the Pastures beyond, and in several Places nigh Sturbridge very plentifully. Cat. Cant. App.

Angelica

est *Herba ferulacea*, semine striato, brevi, lato, magno: floribus in Corymbum dispositis: foliis compositis, latissimis.

Angelica sylvestris Ger. Park. Dod. Matth. Cat. Cant. Hist. 434.

Smyrnum

est *Herba ferulacea*, semine striato, brevi, lato, magno, tumido: foliis compositis.

Smyrnum

Smyrnum Officinarum. *Hipposelinum Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 437.*

Cicuta

est *Herba ferulacea*, seminibus brevibus, tumidis & subrotundis: petalis inæqualibus, bifidis: foliis tenuiter dissectis.

Cicuta Officinarum. *Cicuta Trag. Matth. Dod. Ad. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 451.*

Cicuta minor Petroselino similis C. B. Pin. 160. *Cicutaria fatua Lob. Cat. Cant. Cicutaria tenuifolia Ger. Hist. 451.*

Phellandrium

est *Herba ferulacea*, seminibus striatis, brevibus, latis, magnis: petalis æqualibus, bifidis: foliis tenuiter dissectis.

Phellandrium Officinarum. *Cicutaria palustris Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 452.*

Seseli

est *Herba ferulacea*, seminibus brevibus, tumidiusculis: floribus ex luteo pallidis petalis subrotundis: foliorum segmentis angustis, acutis.

Seseli pratense nostras Park. 905. *Saxifraga Anglica facie Seseli pratensis Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 453.*

Apium

est *Herba ferulacea*, seminibus exiguis, striatis brevibus, tumidis: petalis integris: foliis compositis.

Apium Officinarum. *Apium palustre seu Officinarum C. B. Cat. Cant. Hist. 447.*

Staphylinus

Staphylinus

est *Herba ferulacea*, seminibus villosis: umbellis a flore delapso in nidi avis formam contractis: foliis tenuiter divisis.

Staphylinus sativus Dioscoridi *C. B. Pin.* 151. Pastinaca sativa Dioscoridis *Lob. Cord. in Diosc. Cat. Cant.* Pastinaca sativa tenuifolia *Ger. Hist.* 465.

Staphylinus sylvestris *Ces.* 7. 21. Daucus Officinarum *C. B. Cat. Cant.* Pastinaca sylvestris sive Staphylinus Græcorum *J. B. Hist.* 465.

Caucalis

est *Herba ferulacea*, semine hispido: petalis inæqualibus, bifidis: foliis compositis.

Caucalis altera purpurascens foliis latioribus & crassioribus semine etiam majore *Ad. Lob. Cat. Cant.*

Caucalis nodosa echinato semine *C. B. Ger. emac. Park. Cat. Cant. Hist.* 468.

Caucalis minor flosculis rubentibus *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 468.

Caucalis segetum minor Anthriscus hispido similis *Hist.* 468. *Small Corn Parsley.* Inter segetes passim. *Cat. Cant. App.*

Caucalis tenuifolia flosculis subrubentibus *Cat. Cant. Hist.* 467.

Caucalis sylvestris foliis Chærophylli *Herm. Flor. Bat.* 13. Myrrhis sylvestris seminibus asperis *C. B. Cat. Cant. Hist.* 469.

Perfoliata

est *Herba ferulacea*, foliis integris, a caule perforatis: seminibus exiguis, oblongis, striatis.

Perfoliata Officinarum. Perfoliata *Matth. Dod.* Perfoliata vulgaris *Ger. Park. Hist.* 471.

Bupleurum

Bupleurum

est *Herba ferulacea*, foliis integris, a caule non perforatis: seminibus exiguis, oblongis, striatis.

Bupleurum minimum Park 587. *Auricula Leporis minima* J. B. *The least Hare's Ear. By the Way-side as you go to St. Neot's beyond Ellesly. Augusto & Septembri mensibus floret & semen perficit.* Cat. Cant. App.

Sanicula

est *Herba ferulacea*, foliis laciniatis: floribus in capitulum conglobatis; petalis ad centrum floris reflexis: seminibus echinatis.

Sanicula Officinarum. *Sanicula sive Diapensia* Ger. Park. Brunf. Matth. Dod. Cat. Cant. Hist. 475.

Hydrocotyle

est *Herba ferulacea*, foliis peltatis: floribus in capitulum conglobatis: seminibus planis & semi-orbiculatis.

Hydrocotyle vulgaris Tourn. Inst. 328. *Cotyledon aquatica* J. B. Cat. Cant. Hist. 1323.

GENUS XII.

HERBAE STELLATAE

Floribus monopetalis, quadripartitis aut quinquepartitis: seminibus ad singulos flores binis: foliis caules per intervalla stellæ radiantis in modum ambientibus, a reliquis distinguuntur.

Cruciata

est *Herba stellata*, floris tubo breviorē: foliis ad singula

singula caulis genicula quatuor in crucis formam dispositis : floribus verticillatim ad caulium nodos dispositis.

Cruciata Officinarum. *Cruciata Dod. Ger. Cat. Cant. Hist.* 479.

Gallium

est *Herba stellata*, polyphylla : floris tubo brevioribus : floribus ad caulium nodos dispositis.

Gallium Officinarum. Gallium luteum Lob. Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 482.

Gallium album vulgare Tourn. Inst. 115. *Mollugo montana* sive *Gallium Ger. Cat. Cant. Mollugo vulgator Park. Hist.* 481.

Gallium vulgare asperum quod *Aparine Officinarum. Aparine Ger. F. B. Cat. Cant. Hist.* 484.

Gallium humilius folio hirsuto semine minus aspero. *Aparine semine læviore Hist.* 484. Inter segetes presertim solo cretaceo, *as about Gogmagog-bills. Cat. Cant. App.*

Mollugo

est *Herba stellata*, polyphylla : floris tubo brevioribus : floribus in summis caulibus velut in umbellas digestis.

Mollugo minor palustris H. Ox. 3. 331. *Gallium album Tab. Ger. Cat. Cant. Hist.* 481.

Mollugo sylvatica quæ *Asperula Officinarum. Asperula Ger. Lob. Lugd. Cat. Cant. Hist.* 483.

Mollugo montana minor Gallio albo similis Hist. 482. *Small Mountain Bastard Madder.* Provenit tum in palustribus tum in montosis & ericetis ; parvitate sua & glabritie a *Mollugine minore palustri* distinguitur. *On the Heath beyond Gamlingay. Cat. Cant. App.*

Asperula

Asperula

est *Herba stellata*, polyphylla : floris tubo longiore : floribus in summis caulibus, in capitula collectis, multis ad basin foliis radiatim cincta : seminibus singulis tribus aculeis in summitate donatis.

Asperula cærulea repens Boer. Ind. 140. Rubeola arvensis Cam. Cat. Cant. Rubeola arvensis repens cærulea C. B. Hist. 483.

Rubeola

est *Herba stellata*, tetraphylla ; floris tubo longiore : floribus in summitate caulis quasi in umbellis.

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis floribus purpurantibus Tourn. Inst. 130. Rubia cynanchica F. B. C. B. Hist. 485. Synanchica Lugd. p. 1125. Ger. Squinancy-wort. On Gogmagog-hills and New-market-beath. Cat. Cant. App.

GENUS XIII.

HERBÆ ASPERIFOLIAE, seu maris
BUGLOSSACEAE

Foliis in caulibus alterno aut nullo ordine positis ; floribus monopetalis, quinquepartitis ; seminibus ad singulos flores quaternis a reliquis *Gymnospermis* differunt.

Cynoglossum

est *Herba buglossacea*, seminibus asperis, lappaceis, compressis, extremitatibus acutis, sursum ad stylum directis.

Cynoglossum Officinarum. Cynoglossum vulgare F. B. Cat. Cant. Hist. 489.

Buglossum

Buglossum

est *Herba asperifolia*, seminibus rugosis: floribus regularibus in quinque segmenta obtusa seu orbiculata expansis.

* *Buglossum arvense* annuum *Lithospermi folio* *Tourn. Inst.* 134. *Anchusa degener* facie *Miliæ Solis* *Lob. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 503.

Echioides

est *Herba buglossacea*; seminibus rugosis: floribus e longo tubo incurvo in quinque segmenta obtusa expansis.

Echioides flore albo *Riv. Jrr. mon.* *Buglossi sylvestris minor* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 494.

Echium

est *Herba buglossacea*, flore incurvo ex angusto principio in latum expanso, superiore parte longius excurrente, inferiore brevior.

Echium Officinarum. *Echium C. B. J. B. Park.* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 498.

Echium alterum *Dod. Cat. Cant.* *Echium ramosius* annuum, flore suave-rubente *Moris. hist. Supp.* 210.

Lithospermum

est *Herba buglossacea*, seminibus lapideis, splendentibus: flore in quinque segmenta subrotunda expanso: foliis in spica floribus intermixtis

Lithospermum Officinarum. *Lithospermum sive Milium Solis* *J. B. Cat. Cant. Hist.* 503.

Scorpiurus

est *Herba buglossacea*, seminibus lapideis, splendentibus:

tibus : flore in quinque segmenta subrotunda expanso : spicis florum prælongis, nullis intermixtis foliis.

Scorpiurus annuus arvensis hirsutus cæruleus *H. Ox.* 3. 540. *Myosotis scorpioides hirsuta Park. Cat. Cant. Hist.* 504.

Scorpioides palustris perennis viridioribus foliis *H. Ox.* 3. 541. *Myosotis scorpioides palustris Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 504.

Asperugo

est *Herba buglossacea*, caulibus & foliis asperis, ad vestes adhærentibus ; tribus interdum quatuorve simul nascentibus ; floribus in foliorum alis ; calycibus in involucria bivalvia, triquetra, laciniata, semina parva, compressa continentia excrecentibus.

Asperugo vulgaris Tourn. Inst. 135. *Alysson Germanicum echinoides Lob. Lugd. hort. Hafn. hort. Ludg. Bat. Cat. Cant. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus C. B. Hist.* 502.

Symphytum

est *Herba buglossacea*, floribus cylindraccis pendulis : seminibus politis & lucidis.

Symphytum Officinarum Consolida major Ger. Trag. Cam. Thal. Cat. Cant. Hist. 505.

GENUS XIV.

HERBAE & SUFFRUTICES VERTICILLATAE, seu *maris*, FLORE LABIATO

Foliis adversis : floribus monopetalis, labiatis : seminibus ad singulos flores quaternis distinguuntur.

Serpyllum

Serpyllum

est *Suffrutex flore labiato*, galea elata & bifida ; barba tripartita : foliis brevibus & latiusculis : ramulis prociduis : floribus in capitula in summis caulibus habitiora congestis.

Serpyllum Officinarum. *Serpyllum vulgare* *J. B.* *Cat. Cant. Hist.* 521.

Serpyllum hirsutum *Ger. emac. Cat. Cant.* *Serpyllum angusto lanuginosoque folio* *J. B. Hist.* 522.

Chamædrys

est *Suffrutex flore labiato*, galea carente, barba quinquepartita : floribus in singulis foliorum alis binis.

Chamædrys Officinarum. *Chamædrys vulgaris* *Park. Hist.* 527. *Chamædrys vulgo vera existimata* *J. B. vulgaris* *Park. Germander. In a little Island nigh the Road by Qui-water on the right Hand from Cambridge.* *Cat. Cant. App.*

Mentha

est *Herba flore labiato*, in lacinias propemodum æquales dissecto ; segmento quod pro galea est bifido : radicibus reptatricibus.

Mentha aquatica Officinarum. *Mentha aquatica sive Sisymbrium* *J. B. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 533.

Mentha arvensis verticillata hirsuta *J. B. 3. 2. 217.* *Calamintha aquatica* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 530.

Mentha sylvestris rotundiore folio *C. B. Pin.* 227. *Mentastrum folio rugoso rotundiore spontaneum flore spicato odore gravi* *J. B. Hist.* 532. *Horse-mint*

*mint or round-leav'd wild Mint. In the Chalk-pit
Close at Cherry-Hinton Cat. Cant. App.*

*Mentha sylvestris folio longiore C. B. Pin. 227.
Mentastrium spicatum folio longiore candicante
J. B. Hist. 532. In a bushy Close near Exning. Cat.
Cant. App.*

Pulegium

est Herba flore labiato, in quatuor partes propemodum æquales dissecto; galea integra.

*Pulegium Officinatum. Pulegium Brunf. Trag.
Matth. Cord. Dod. Cam. J. B. Cat. Cant. Hist. 533.*

Pseudo-marrubium

est Herba flore labiato, in quatuor aut quinque, segmenta subrotunda promemodum æqualia dissecto; calyce in sex segmenta acuta diviso.

*Pseudo-marrubium palustre Riv. Irr. mon. Mar-
rubium aquaticum Ger. emac. Trag. Dod. Lob. Cat.
Cant. Hist. 535.*

Verbena

est Herba flore labiato, in quinque segmenta propemodum æqualia dissecto; calyce longo, tubuloso, quinquefido: floribus in spicis, nullis foliis intermixtis.

*Verbena Officinatum. Verbena vulgaris J. B.
Cæs. Cat. Cant. Hist. 535.*

Horminum

est Herba floribus labiatis, in spicas digestis; galea cava, non falcata, nec adunca, barba tripartita, media portione bifida & excavata.

*Horminum sylvestre Officinatum. Horminum
sylvestre Ger. Fuch. Dod. Cat. Cant. Horminum
sylvestre Lavendulæ flore C. B. Park. Hist. 545.*

Prunella

est *Herba floribus labiatis*, in spicas digestis breves, habitiores ; barba tripartita, medio segmento latiore & productiore, in cochlearis formam excavato ; calyce in duo labia diviso, quorum superius in spinulas manifeste non dividitur, inferius in duas spinulas exit.

Prunella Officinarum. Prunella Ger. Cat. Cant. Hist. 551.

Betonica

est *Herba floribus labiatis*, in spicas habitiores digestis, sessilibus ; galea elata & bifida, barba tripartita, media parte bifida ; calyce quinquesido.

Betonica Officinarum. Betonica Ger. Trag. Dod. Tur. Lob. Lugd. Cat. Cant. Hist. 550.

Nepeta

est *Herba floribus labiatis*, in spicas habitiores digestis ; pediculis ramosis innitentibus ; galea erecta, bifida ; barba tripartita, medio segmento in cochlearis formam excavato, leviter serrato ; lateralibus duobus velut alis extantibus.

Nepeta Officinarum. Mentha cattaria J. B. Cat. Cant. Hist. 348.

Galeopsis

est *Herba floribus labiatis*, in summis caulibus in spicas longas excurrentibus ; galea cochlearis instar excavata ; barba tripartita, medio segmento obtuso, longo, lato, utrinque reflexo ; lateralibus parvis brevibus.

Galeopsis legitima Dioscoridis Park. Clus. hist. Cat. Cant. Hist. 548.

Galeopsis

Galeopsis angustifolia foetida *J. B.* 3. 854. *Sideritis Anglica frumosa radice* *Park. Cat. Cant. Hist.* 563.

Galeobdolon

est *Herba floribus labiatis*, in verticillis dispositis : galea cochlearis instar excavata, barba tripartita.

Galeobdolon *Dillen. Cat. Giff.* 49. *Lamium luteum* *Ger. emac. Park. Lob. Cat. Cant. Hist.* 560.

Ladanum

est *Herba floribus labiatis*, in verticillis densioribus : galea cochlearis instar excavata ; barba tripartita ; calycum segmentis aculeatis.

Ladanum segetum quorundam flore rubro *J. B. Cat. Cant. Hist.* 566.

Ladanum verticillis crebrioribus flore purpureo caule fulcrato *Dillen. Cat. Giff.* 135. *Cannabis spuria* *Park. Ger. Cat. Cant. Hist.* 561.

Lamium

est *Herba floribus labiatis*, in verticillis dispositis ; galea cochlearis instar excavata ; barba bifida ; gula etiam floris ala utrinque terminata : seminibus majusculis, e calycibus patulis brevibus maturitate illico decidentibus.

Lamium album *Officinarum.* *Lamium album* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 559.

Lamium rubrum *Officinarum.* *Lamium rubrum* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 559.

Lamium folio caulem ambiente majus & minus *C. B. Hist.* 560. *Alfina hederula altera* *Ger. Cat. Cant.*

Marrubium

est *Herba floribus labiatis*, in verticillis densis ; ga-

lea elata, in duo segmenta velut cornua fissa ; barba tripartita ; calyce in totidem spinulas, quot in eo sunt striæ, ad duodecim usque exeunte.

Marrubium album *Officinarum*. Marrubium album *J. B. Ger. Cat. Cant. Hist.* 556.

Marrubiastrum

est *Herba floribus labiatis*, galea cochlearis instar excavata ; barba in tres crenas divisa.

Marrubiastrum vulgare *Tourn Inst.* 190. *Sid. f. humilis lato obtuso folio Ger. emac. Hist.* 565. *Sid. Alfine Triflaginis folio C. B. Park. Petty All-beal. In a Close call'd Gains nigh Teversham. Cat. Cant. App.*

Ballote

est *Herba floribus labiatis*, in singulis pediculis, e singulis foliorum alis egressis, pluribus confertis ; galea cochlearis instar excavata ; barba tripartita, medio segmento bifido ; calycibus minus patulis & longioribus.

Ballote *Matth. Fuch. Dod. Tur. Cas. Lob. Lugd. Lac. Cat. Cant. Hist.* 563.

Clinopodium

est *Herba floribus labiatis*, in verticillis densis, circa caulium nodos, tubis longioribus ; galea rotundata, elata, bifida ; barba tripartita, segmento medio latissimo.

Clinopodium majus *Park. Cat. Cant. Hist.* 558.

Acinos

est *Herba floribus labiatis*, ex alis foliorum exeuntibus ; calycibus oblongis, striatis, collo angusto, ventre turgidiore.

Acinos

Acinos Anglica *Clus. Cat. Cant.* Acinos multis
J. B. Hist. 553.

Cardiaca

est *Herba floribus labiatis*, verticillatim dispositis ;
 galea cochlearis instar excavata ; barba tripartita :
 calyce valde brevi, & seminibus ad summitatem
 usque repleto.

Cardiaca Officinarum. Cardiaca *J. B. Park.*
Hist. 555. Marrubium nigrum 1. seu Mart. Car-
 diaca dictum, forte primum Theophrasti *C. B.*
Motherwort. On a Bank of a Close on the backside of
Trumpington looking towards Shelford. Cat. Cant.
App.

Calamintha

est *Herba floribus labiatis*, pediculis oblongis ramo-
 sis, e foliorum alis egressis insidentibus, raris &
 sparsis ; galea erecta, bifida, rotundata ; barba
 tripartita.

Calamintha montana Officinarum. Calamintha
 vulgaris *Park. Cat. Cant. Hist.* 569.

Calamintha odore Pulegii *Ger. Hist.* 569. Ca-
 lamintha flore minore odore Pulegii *J. B.* altera
 odore Pulegii foliis maculosis *Park.* Pulegii odore
 five Nepeta *C. B. Field Calamint.* Hanc Plantam
 in Catalogo habui pro Calamintha vulgari. Cala-
 mintha tamen quam modo vulgarem puto circa
 Chestertonum & alibi sponte provenit *Cat. Cant.*
App.

Chamæcissus

est *Herba floribus labiatis*, in foliorum alis confertis,
 sessilibus ; galea erecta, bifida, reflexa ; barba tri-
 partita ; medio segmento lato, & bifido.

Chamæcissus Officinarum. Hedera terrestris
Ger. Cat. Cant. Hist. 567.

Scutellaria

est *Herba floribus labiatis*, oblongis, in singulis foliorum alis singulis; calyce semina continente operculato, crepidæ aut calceamenti calcaneum referente.

Scutellaria palustris repens cærulea H. Ox. 3. 416. *Lysimachia galericulata* Lob. Lugd. Clus. hist. Cat. Cant. *Lysimachia cærulea galericulata* sive *Gratiola cærulea* C. B. Hist. 572.

Chamæpitys

est *Herba floribus labiatis*, galea carentibus; sparsim in foliorum alis: barba tripartita, media portione bifida.

Chamæpitys Officinarum, *Chamæpitys vulgaris* Park. Cat. Cant. Hist. 573.

Bugula

est *Herba floribus labiatis*, non galeatis, verticillatim dispositis; barba tripartita.

Bugula Officinarum. *Bugula* Ger. Dod. Lob. Clus. Cat. Cant. Hist. 575.

Scordium

est *Herba floribus labiatis*, non galeatis, verticillatim dispositis; barba quinquefida.

Scordium Officinarum. *Scordium* J. B. C. B. Matth. Dod. Ger. Cat. Cant. Hist. 576.

GENUS

GENUS XV.

HERBAE GYMNOPOLYSERMAE.

Malva

est *Herba gymnopolysperma*, seminibus in caseoli formam circumactis: flore monopetalo, pentapetaloides; calyce duplici, interiore quinquepartito, exterioriore tripartito.

Malva vulgaris Officinarum. *Malva vulgaris* Park. Cat. Cant. Hist. 599.

Malva sylvestris minor Park. Cat. Cant. Hist. 599.

Malva verbenacea Ger. 785. *Alcea vulgaris* J. B. Hist. 604. *Dod. Ad. Lob. Clus. hist. vulgaris major* C. B. *vulgaris sive Malva verbenacea* Park. *Vervain Mallow*. In *Kingston-wood*. Cat. Cant. App.

Althæa

est *Herba gymnopolysperma*, seminibus in caseoli forma circumactis: flore monopetalo, pentapetaloides; calyce duplici, interiore quinquepartito, exterioriore in decem segmenta diviso.

Althæa Officinarum. *Althæa* Dod. Lob. Matth. Cat. Cant. *Althæa vulgaris* Park. Hist. 602.

Althæa vulgaris similis folio retuso brevi. In palustribus Eliensibus se observasse scribit *Plukenetius Alm.* p. 24.

Alisma

est *Herba gymnopolysperma*, floribus tripetalis androgynis; calyce non deciduo, trifido.

Alisma Cord. in Diosc. Plantago aquatica *J. B. Cat. Cant. Hist.* 618.

Alisma angustifolium capitulis rotundis echinatis. Plantago aquatica minor *Park. Tab. Cas. Cat. Cant. Hist.* 618.

Sagitta

est *Herba gymnopolsperma*, floribus tripetalis, sexu diversis in eadem Planta.

Sagitta major *J. B. Ger. Dod. Matth. Tab. Cat. Cant.* *Sagitta minor* *J. B. Hist.* 619.

Sagitta minor *Lob. Lugd. Matth. Dod. Tab. Cat. Cant.*

Tormentilla

est *Herba gymnopolsperma*, floribus tetrapetalis calyce in octo segmenta diviso.

Tormentilla Officinarum. Tormentilla *Ger. Trag. Matth. Dod. Lac. Lob. Cat. Cant. Hist.* 617.

Ranunculus

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis, cum calyce pentaphyllo, deciduis: feminibus in globulum congestis: caulibus ramosis, aut saltem uno aut pluribus foliis ornatis; flore unico ramulos singulos terminante.

Ranunculus palustris rotundifolius *Ger. Cat. Cant. Hist.* 585.

Ranunculus arvorum *Park. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist.* 585.

Ranunculus tuberosus major *J. B. 3. 417. Ranunculus bulbosus* *Ad. Lob. Ger. Park. Cat. Cant. Hist.* 581.

Ranunculus flammeus major *Ger. Cat. Cant. Hist.* 587.

Ranunculus

Ranunculus flammeus minor Ger. Cat. Cant. Hist. 587.

Ranunculus flammeus ferratus Ger. Park. Cat. Cant.

Ranunculus auricomus Ger. Cat. Cant. *Ranunculus nemorosus dulcis secundus* Tragi Park. Hist. 584.

Ranunculus pratensis repens Park. Cat. Cant. Hist. 581.

Ranunculus hirsutus annuus flore minimo Hist. 583. *Field Crowfoot with a small Flower.* In arvis restibilibus & aggeribus fossarum sed rarius. Cat. Cant. App.

Ranunculus pratensis erectus acris C. B. Hist. 583. *pratensis erectus acris vulgaris* Park. *surrectis cauliculis* Ger. *rectus non repens flore simplici luteo* J. B. *Upright Meadow Crowfoot.* In pratis vulgaris. Cat. Cant. App.

Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirsutus J. B. Hist. 582. *Upright pale-leav'd Crowfoot.* In locis humidis & lutosi ubi per hyemem aquæ stagnarunt. Cat. Cant. App.

Ranunculoides

est *Herba gymnopolysperma*, floribus pentapetalis, cum calyce pentaphyllo, deciduis: seminibus in globulum congestis: floribus caulem aut ramulos minime terminantibus; sed pediculis nudis sustentatis, ex alis foliorum egressis.

Ranunculoides foliis variis Vaill. Mem. Acad. 1719. *Ranunculus aquatilis* Dod. Ger. Cat. Cant. Hist. 586.

Ranunculoides repens bijugis hederaceis foliis Vaill. Mem. Acad. 1719. *Ranunculus hederaceus rivulorum* se extendens atra macula notatus J. B. Cat.

Cat. Cant. *Ranunculus aquaticus hederaceus albus*
C. B. Hist. 586.

Ranunculoides Fœniculi folio brevior *Vaill.*
Mem. Acad. 1719. *Millefolium aquaticum Ranunculi flore & capitulo* *Park. Cat. Cant.* *Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius* *J. B. Hist.* 586.

Ranunculoides Fœniculi folio longior *Vaill.*
Mem. Acad. 1719. *Ranunculo sive Polyanthemum aquatili albo affine Millefolium Maratriphyllum fluitans* *J. B. Hist.* 586: *Millefolium Maratriphyllum Ranunculi flore* *Park.* *Millefolium aquaticum* 7. *sive foliis Fœniculi Ranunculi flore & capitulo* *C. B. Fennell-leav'd Water Crowfoot. In the River between Cambridge and Chesterton.* *Cat. Cant. App.*

Myosuros

est *Herba gymnopolsperma*, floribus quinque petalis tubulosis constantibus : seminibus in longam spicam caudæ muris æmulam dispositis.

Myosuros *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1332.

Caryophyllata

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis; calycibus in decem segmenta divisus : seminibus caudatis.

Caryophyllata Officinarum. *Caryophyllata* *Ger. Dod. Cat. Cant. Hist.* 606.

Caryophyllata vulgaris majore flore *C. B. Hist.* 606. *Cat. Cant. App.*

Fragaria

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis; calyce in decem segmenta diviso : seminibus pulpæ molli, esculentæ innascentibus : foliis trifoliatis; flagellis reptatricibus.

Fragaria

Fragaria Officinarum. *Fragaria Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist.* 609.

Comaroides

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis; calyce in decem segmenta diviso: fructu non esculento: foliis trifoliatis: flagellis carens.

Comaroides Pont. Anth. 290. *Fragaria minime vesca Park. Cat. Cant. Fragaria sterilis C. B. Hist.* 611.

Quinquefolium

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis; calyce in decem segmenta diviso: fructu non esculento: foliis quinquefoliatis.

Quinquefolium Officinarum. *Pentaphyllum vulgare Ger. Cat. Cant. Pentaphyllum vulgatissimum Park. Hist.* 611.

Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum erectum foliis profunde sectis subtus argenteis flore luteo J. B. Hist.* 613. *rectum minus Park. Quinquefolium Tormentillæ facie Ger. Tormentil Cinquefoil. In many Places about Linton and Gamlingay. Cat. Cant. App.*

Pentaphylloides

est *Herba gymnopolsperma*, floribus pentapetalis; calyce in decem segmenta diviso: fructu non esculento: foliis pinnatis.

Pentaphylloides palustre rubrum Tourn. Inst. 298. *Pentaphyllum rubrum palustre Ger. Lob. ico. Cat. Cant. Hist.* 611.

Pentaphylloides Argentina dicta Hist. 617. *Argentina Dod. Lob. Ger. Cat. Cant.*

Ficaria

Ficaria

est *Herba gymnopolysperma*, flore polypetalo; cum calyce triphylo, deciduo: radice grumosa.

Ficaria Brunfels. *Chelidonium minus Matth. Fuch. Dod. Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 579.*

Filipendula

est *Herba gymnopolysperma*, flore polypetalo; seminibus in capitulum, dolii æmulum collectis.

Filipendula Officinarum. *Filipendula Ger. Dod. Matth. Cord. hist. Tab. F. B. Cat. Cant. Hist. 623.*

Anemonoides

est *Herba gymnopolysperma*, flore polypetalo, nudo: seminibus non papposis, in capitulum rotundum congestis.

Anemonoides flore majore Dillen. Cat. Giff. 39.
Anemone nemorum Ger. Cat. Cant. Hist. 624.

Pulsatilla

est *Herba gymnopolysperma*, flore polypetalo, nudo: seminibus cincinnatis, plumulis longis adhærentibus.

Pulsatilla vulgaris Ger. Hist. 633. *Pulsatilla Matth. Dod. Tab. Lugd. Cat. Cant.*

Clematitis

est *Herba gymnopolysperma*, flore tetrapetalo, nudo: seminibus plumulis longis adnascantibus cincinnatis.

Clematitis sylvestris latifolia C. B. Pin. 300.
Viorna Ger. Cat. Cant. Clematis latifolia sive Atragene quibusdam F. B. Hist. 620.

Herbæ

Herbæ Dicotyledones flore petalode simplici; seminibus vasculis inclusis, *vascula* habent per maturitatem vel *humida*, vel *secca*. Quæ *vasculis humidis* donantur *florem* habent vel *androgynum* vel *sexu diversum*.

GENUS XVI.

HERBÆ POMIFERÆ, seu *mavis* CUCURBITACEÆ

Floribus monopetalis, sexu diversis; calyce vel nullo, vel cum petalo continuo: fructibus humidis, ab aliis omnibus *Plantis* distinguuntur.

Bryonia

est *Herba cucurbitacea*, flore pentapetaloide, expanso: fructu parvo.

Bryonia alba Officinarum. *Bryonia alba* *Dod. Lugd. Thal. Ger. Cat. Cant. Hist.* 659.

Bryonia alba baccis nigris *C. B.* *alba vulgaris* fructu nigro *Park.* *Vitis* sive *Bryonia nigris* baccis *J. B. Hist.* 659. Circa *Cantabrigiam* haud infrequens. *Pluk. Amalth.* 45.

Tamarum

est *Herba cucurbitacea*, flore hexapetaloide, expanso; fructu parvo.

Tamarum vulgo *Cas.* 5. 9. *Bryonia nigra* *Ad. Ger. Cat. Cant.* *Bryonia nigra sylvestris* *Ger. Hist.* 661.

GENUS

GENUS XVII.

HERBAE BACCIFERAE

Floribus androgynis a *Cucurbitaceis* differunt.

Ruscus

est *Herba baccifera*, folio in spinam abeunte : bacca e medio folio exunte, nullo pediculo innixo.

Ruscus Officinarum. *Ruscus* J. B. C. B. Park. Hist. 664. *Ruscus* five *Bruscus* Ger. *Myrtacanta murina* spina Lob. icon. *Oxymirline Anguill. Butcher's Broom. About Anglesey-Abbey. Cat. Cant. App.*

Herba Paris

est *Herba baccifera*, bacca unica : flore tetrapetalo ; calyce quadrifolio.

Herba Paris Matth. Dod. Ger. Park. J. B. Cat. Cant. Hist. 670.

Belladonna

est *Herba baccifera*, flore campaniformi, margine quinquepartito : fructu majore in duas cellas diviso.

Belladonna Clus. Pan. 504. *Solanum lethale* Park. Ger. Dod. Clus. hist. Cat. Cant. Hist. 679.

Solanum

est *Herba baccifera*, flore monopetalo, in quinque segmenta, stellæ instar, expanso ; apicibus coitu suo umbonem componentibus : seminibus parvis, compressis.

Solanum vulgare Officinarum. *Solanum* five *Solatrum* vulgare Park. Cat. Cant. Hist. 672.

Solanum

Solanum lignosum *Officinarum*. *Solanum* lignosum sive *Dulcamara* *Park. Cat. Cant. Hist.* 672.

Arum

est *Herba baccifera*, flore monopetalo, linguæformi, convoluto, basi fructuum cohærente: fructu e baccis coacervatis intra pulpam humidam unum vel duo semina continentibus constante.

Arum *Officinarum*. *Arum* *J. B. Cat. Cant.*

Oxycoccus

est *Herba baccifera*, floribus tetrapetalis: baccis tetrapyrenis.

Oxycoccus sive *Vaccinia palustris* *J. B.* 1. 525. *Vaccinia palustris* *Ger. Hist.* 685. *Vaccinium palustre* *Park. Vitis Idæa palustris* *C. B. Marsh Whortle-Berries, Mosse-Berries, or Moor-Berries. In the Bogs about Gamlingay plentifully. Cat Cant App.*

Moschatellina

est *Herba baccifera*, floribus in summitate caulis quinque in capitulum cubicum dispositis; quatuor lateralibus quinquepartis, summo quadripartito.

Moschatellina foliis *Fumariæ bulbosæ* *J. B. Hist.* 684. *Radix cava minima viridi flore* *Ger. Cat. Cant.*

Nymphoides

est *Herba baccifera*, flore monopetalo, pelvisiformi, in quinque lacinias diviso; calyce quinquepartito: fructu oblongo, compresso, parum carnosio; unica intus cavitate plura semina calyptra membranosa involuta continente.

Nymphoides aquis innatans *Tourn. Inst.* 153. *Nymphæa lutea minor flore fimbriato* *J. B. Cat. Cant.*

Herbæ

Herbae Dicotyledones, flore petalode, simplici; seminibus *vasculis siccis* inclusis, *vascula* habent ad singulos flores vel *singula* vel *plura*.

GENUS XVIII.

HERBAE MULTISILIQUAE.

Sedum

est *Herba multiflora*, floribus pentapetalis, aut hexapetalis: foliis crassis & succulentis.

Sedum minus hœmatoides Ger. Cat. Cant. Hist. 691.

Sedum minus Officinarum. Ger. Cat. Cant. *Sedum minus teretifolium album* C. B. Hist. 1040.

Sedum minimum Officinarum. *Sedum* sive *Sempervivum minimum* acre P. B. Cat. Cant. *Sedum parvum* acre flore luteo J. B. Hist. 1041.

Crassula

est *Herba multiflora*, floribus in summis caulis, velut in umbellas aut fasciculos coactis, pentapetalis, stellatis: foliis crassis.

Crassula Officinarum. *Telephium* Matth. Lob. Tab. Cam. Cat. Cant. *Telephium vulgare* C. B. Hist. 689.

Helleborus

est *Herba multiflora*, tubulis aliquot circa stamina positis; foliis quinque munitis.

Helleborus niger hortensis flore viridi C. B. Cat. Cant. Hist. 697.

Helleborus niger foetidus C. B. Pin. 185. *Helleborus maximus* Ger. Hist. 698. *maximus* sive *Confiligo* Park. *Enneaphyllon* Plinii. *Great Bastard Hellebore*

Hellebore or *Bears-foot*. In the second Close on the left Hand as you go from Hinton Church to Fulbourn; also in the Hedges of a Close near Hinton-moor. Cat. Cant. App.

Ulmaria

est *Herba multiflora*, floribus regularibus pentapetalis, exiguis, racematim dispositis.

Ulmaria Officinarum. *Ulmaria* Gesn. Clus. Lugd. Cam. Tab. J. B. Cat. Cant. Barba capri J. B. Hist. 709.

Caltha

est *Herba multiflora*, floribus regularibus, pentapetalis, nudis.

Caltha palustris J. B. Cat. Cant. Hist. 700.

Butomus

est *Herba multiflora*, caulibus nudis, in summitate, quasi in umbella, flores plurimos sustinentibus hexapetalos, aut tripetalos cum calyce triphylo.

Butomus Cas. 14. 17. *Gladiolus palustris* Cord. Ger. Cat. Cant. *Juncus floridus* J. B. Park. Hist. 701.

Pervinca

est *Herba multiflora*, floribus monopetalis regularibus, quinquepartitis.

Pervinca vulgaris angustifolia Toarn. Inst. 120. *Clematis daphnoides minor* J. B. C. B. Dod. Leb. Cat. Cant.

Aquilegia

est *Herba multiflora*, floribus irregularibus, pendulis, e petalis planis & corniculatis, alternis, compositis; seminibus nigris, lucidis,

F

Aquilegia

Aquilegia Officinarum. Aquilegia sylvestris C. B. Cat. Cant. Aquilegia flore simplici J. B. Hist. 706.

Delphinium.

est Herba multiflora, floribus irregularibus calcari donatis: seminibus nigris, triquetris: folio in tenues lacinias dissectis.

Delphinium arvense Park. Consolida regalis arvensis C. B. Conf. reg. flore minore J. B. Conf. reg. sylvestris Ger. Hist. 208. Found in great Plenty by Mr. J. Sherard amongst the Corn in Swafham field. Syn. 273.

Herbæ Dicotyledones, flore petalode, simplici; seminibus vasculis siccis inclusis, ad singulos flores singulis, florem habent vel monopetalum, vel dipetalum, vel tetrapetalum, vel pentapetalum, vel hexapetalum.

GENUS XIX.

HERBÆ VASCULIFERÆ FLORE MONOPETALO, DIPETALO, & TRIPETALO.

Hyoscyamus

est Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, in quinque segmenta leviter diviso; calyce in denticulos acuminatos quinquepartito: vasculo bicapulari, operculo testito, quod per maturitatem sponte abscedit.

Hyoscyamus niger Officinarum. Hyoscyamus niger Dod. Lob. Ger. Cat. Cant. Hyoscyamus vulgaris J. B. Hist. 711.

Gentiana

Gentiana

est *Herba vasculifera, flore monopetalo, regulari* : vasculo unicapulari, bivalvi.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *C. B. Pin.* 188. *Gentianella fugax autumnalis minor* *Ger. emac. Cat. Cant.* *Gentianellæ* species quibusdam, An *Cordo Pneumonanthe* aut *Gentiana fugax altera Clusii* *J. B. Hist.* 719.

Convolvulus

est *Herba vasculifera flore monopetalo, regulari, integro* : vasculo tricapsulari.

Convolvulus major *J. B. Cat. Cant. Hist.* 725.

Convolvulus minor arvensis *C. B. Cat. Cant.* *Convolvulus minor vulgaris* *Park. Hist.* 725.

Convolvulus minimus. The least Bindweed. Folia habet hæc planta angusta, cuspidata Sagittæ fere in modum, foliis *Convolvuli minoris vulgaris* multo minora ; Flores etiam obtinet minores ; Videtur itaque ab illo specificè differre, quippe quod cum in eodem solo juxta crescant supradictas tamen differentias sortiantur. *In the Corn between Harleston and little Eversden.* *Cat. Cant. App.*

Campanula

est *Herba vasculifera flore monopetalo, regulari, campaniformi* ; margine quinquepartito : vasculo tricapsulari.

Campanula rotundifolia *Ger. Cat. Cant. Hist.* 740.

Campanula major & asperior folio Urticæ *J. B.* 2. 805. *Trachelium majus* *Ger. Cat. Cant. Hist.* 732.

Campanula pratensis flore conglomerato C. B. *Pin.* 94. *Trachelium minus* Lob. *Dod. gal. Park.* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 735.

Rapunculus

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, regulari in quinque segmenta stellæ instar expanso : vasculo tricapsulari.

Rapunculus Scabiosæ capitulo cæruleo C. B. *Park. Cat. Cant. Hist.* 744.

Speculum Veneris

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, in quinque segmenta lata dissecto : vasculo oblongo, in filiquam producto.

Speculum Veneris minus Ger. *emac. Park. Cat. Cant. Hist.* 743.

Veronica

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*; irregularibus, tetrapetalos referentibus ; aut spicatim dispositis in summis caulibus, aut in singulis foliorum alis singulis : vasculo compresso.

Veronica spicata recta minor J. B. *Cat. Cant. Hist.* 846.

Veronica pratensis *Dod. Cat. Cant.* *Veronica pratensis minor* *Park. Hist.* 848.

Veronica floribus singularibus in oblongis pediculis Chamædryfolia *Syn.* 279. *Alfine foliis Triflaginis* Lob. *Ger. Park. Cat. Cant. Hist.* 847.

Veronica flosculis singularibus, cauliculis adherentibus *Syn.* 279. *Alfine foliis Veronicæ* *Tab. Ger. Cat. Cant. Hist.* 847.

Morsus gallinæ

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, regularibus, tetrapetalos referentibus: vasculo tumidiore & quasi testiculato.

Morsus gallinæ folio hederulæ Lob. Alline hederacea Tab. Ger. Cat. Cant. Hist. 848.

Becabunga

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, irregularibus, tetrapetalos referentibus; in spicis ex foliorum alis egressis dispositis: vasculo compresso.

Becabunga Officinarum. Anagallis aquatica minor folio subrotundo C. B. Cat. Cant. Hist. 852.

Becabunga minor angustifolia. Anagallis aquatica minor folio oblongo C. B. Cat. Cant. Anagallis aquatica minor Ger. Hist. 852.

Becabunga minima angustifolia. Anagallis aquatica angustifolia J. B. Cat. Cant. Hist. 852.

Becabunga foliis subrotundis sessilibus profunde crenatis. Chamædrys sylvestris Ger. Clus. Cat. Cant. Hist. 850.

Becabunga foliis subrotundis crenatis caudis longis donatis. Chamædrys spuria foliis pediculis oblongis insidentibus Hist. 850. Alysson Dioscoridis montanum Col. Wild Germander with Leaves standing on long foot-stalks. In sylvis humidis & ad sepes solo humido sed rarius. Cat. Cant. App.

Becabunga repens foliis subrotundis serratis. Veronica mas supina & vulgatissima C. B. Cat. Cant. Hist. 851.

Cuscuta

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, in quatuor aut quinque segmenta acuta diviso; calyce quadripartito:

partito : vasculo rotundo, semina quatuor oblonga continente.

Cuscuta Officinarum. *Cuscuta major* C. B. Cat. Cant. *Cuscuta Park. Hist.* 1903.

Tithymalus

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, tetrapetalum referente : vasculo tricocco.

Tithymalus Characias amygdaloides C. B. Ger. *emac. Cat. Cant. Hist.* 863.

Tithymalus helioscopius *Fuch. Matth. Lob. Ger. Park. C. B. Cat. Cant. Hist.* 869.

Tithymalus parvus annuus foliis subrotundis non crenatis *Peplus dictus* *Syn.* 313. *Peplus* five *Esula rotunda* C. B. Ger. *J. B. Hist.* 868. *Esula rotunda* five *Peplos* *Park. Petty Spurge.* In agris pinguioribus & hortis inter olera. *Cat. Cant. App.*

Tithymalus segetum longifolius *Cat. Cant. App. Hist.* 868. *Among the Corn beyond Kingston Wood in the way to Gamlingay in several places.* *ibid.*

Tithymalus leptophyllos *Park. Hist.* 868. *Esula exigua* *Trag. Lob. Ger. emac. Cat. Cant.*

Alfinoides

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, pentapetalum referente ; vasculo tricocco.

Alfinoides palustris vulgaris. *Alfene palustris* *Portulacæ aquaticæ similis* *Hist.* 1035. *Small Water Chickweed, or Blinks.* *In the boggy grounds about Gamlingay.* *Cat. Cant. App.*

Anagallis

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, pentapetalos referentibus ; in singulis foliorum alis singulis, pediculis

pediculis longis tenuibus hærentibus : vasculis per maturitatem transversim in medio diffilientibus.

Anagallis terrestris mas Officinarum. Anagallis mas *Ger. Cat. Cant. Hist.* 1023.

Anagallis terrestris fœmina Officinarum. Anagallis fœmina *Matth. Dod. Ger. Trag. Fuch. Cat. Cant. Hist.* 1024.

Primula veris

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, e tubo oblongo in quinque segmenta bifida expanso ; calyce integro, concavo, longo, striato.

Primula veris major Ger. Cat. Cant. Hist. 1081.

Primula veris elatior pallido flore Clus. Hist. hort. Hafn. Cat. Cant. Primula pratensis inodora lutea Ger. Hist. 1081.

Primula veris Officinarum, Primula veris vulgaris Park. Cat. Cant. Hist. 1080.

Lyfimachia

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, in quinque aut sex segmenta ad basin usque diviso : vasculo subrotundo, unicapulari ; summitate per maturitatem in plures partes se aperiente : floribus in summis caulibus.

Lyfimachia Officinarum, Lyfimiachia lutea Trag. Fuch. Tur. Ad. Lob. Cæs. Tab. Cam. Ger. J. B. Cat. Cant. Hist. 1021.

Nummularia

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, in quinque partes profunde divisis ; in singulis foliorum alis singulis : vasculis unicapularibus in plures partes in summitate se aperientibus.

Nummularia Ger. Cat. Cant. Hist. 1099.

Nummularia minor flore purpurascente C. B.
Ger. emac. Park. Cat. Cant. Hist. 1100.

Menianthes

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, quinquepartitis, in thyrsis dispositis, speciosis, interius candidis filamentis crispis pubescentibus : vasculis subrotundis, unicapularibus, bivalvibus.

Menianthes palustre Theophrasti *Lugd. Trifolium palustre* J. B. C. B. *Cat. Cant. Hist.* 1099.

Samolus

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, quinquepartito ; calyce in quinque partes diviso : vasculis unicapularibus in aliquot partes acuminatas se aperientibus ; seminibus parvis rufescentibus repletis.

Samolus Valerandi J. B. 3, 791. *Anagallis aquat. rotundifolia* *Ger. Cat. Cant. Hist.* 1101.

Myriophyllon

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, quinquepartitis, pluribus simul in summitate caulis nudi : vasculo unicapulari.

Myriophyllon Cæs. 6. 60. *Millefolium aquaticum* dictum *Viola aquatica* J. B. *Cat. Cant. Hist.* 1101.

Plantaginella

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, quinquepartitis ; calyce in quinque segmenta diviso : vasculo unicapulari, bivalvi.

Plantaginella palustris C. B. *Hist.* 1077. *Plantago aquatica minima* *Clus. aquat. minima* *Clusii Park. The smallest Water-Plantain.* Secus vias ubi per Hyemem aquæ stagnarunt. *Cat. Cant. App.*

Centaurium

Centaurium minus

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, e tubo oblongo in quinque segmenta acuta expansis: vasculo bicausulari.

Centaurium minus Officinarum. *Centaurium minus* C. B. Dod. Trag. Fuchs. Matth. Tur. Lugd. Tab. Cat. Cant. Hist. 1092.

Centaurium luteum

est *Herba vasculifera flore monopetalo*, in octo segmenta ad unguem fere diviso: vasculo subrotundo, bicausulari.

Centaurium luteum perfoliatum C. B. Cam. Park. Cat. Cant. Hist. 1093.

Verbascum

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, quinque partitis; in Thyrsis oblongis confertis, non horizontaliter expansis, sed situ potius erecto: vasculis bicausularibus, conicis, aut turbinatis.

Verbascum nigrum Dod. Lob. ico. Tab. Ger. Cat. Cant. *Verbascum nigrum* flore parvo apicibus purpureis J. B. Hist. 1095.

Verbascum Officinarum. *Tapsus barbatus* Offic. Ger. *Verbascum mas latifolium luteum* C. B. Hist. 1094.

Oxys

est *Herba vasculifera floribus monopetalis*, in quinque segmenta ad unguem divisis; in singulis pediculis singulis: vasculo pentagono, quinquecapsulari; per maturitatem levi tactu dissiliante, & cum impetu semina ejiciente,

Oxys

Oxys alba Ger. 1030. *Trifolium acetosum* vulgare Park. C. B. Cat. Cant. Hist. 1098.

Aristolochia

est *Herba vasculifera, flore monopetalo, irregulari, corniculato, semistuloso* : vasculo membranaceo, in sex loculamenta diviso.

Aristolochia clematidis officinarum. *Aristolochia clematidis* Park. Hist. 162. *clematidis vulgaris* F. B. *clematidis recta* C. B. *Running-rooted Birthwort.* In several Hedges at Wittlesford.

Scrophularia

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, velut auriculato, ore quam ventre angustiore* : vasculo bicausulari, subrotundo, acuminato.

Scrophularia Officinarum. *Scrophularia major* Ger. Lob. Cat. Cant. Hist. 764.

Scrophularia aquatica Officinarum. *Scrophularia aquatica major* C. B. Hist. 764. *Betonica aquatica* Ger. Dod. Lob. Lugd. Cat. Cant.

Pinguicula

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, in summitate caulis nudi unico* ; calcari donato : vasculo bivalvi, subrotundo.

Pinguicula Gesneri F. B. Hist. 751. *Pinguicula vel Liparis Gesn. hort. Clus. Cat. Cant.*

Linaria

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, rictum exprimente* : vasculo bicausulari ; per maturitatem in plures partes a summitate fisso.

Linaria Officinarum. *Linaria vulgaris nostras* Park.

Park. Cat. Cant. Linaria lutea vulgaris Ger. J. B. Hist. 752.

Linaria Antirrhinum dicta Hist. 760. Antirrhinum minimum J. B. Thal. Cam. Cat. Cant.

Elatine

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, rictum exprimente : vasculo bicapsulari, cujus a summitate utrinque portio lateralis oblique abscedit, & basin vasculi integram relinquit.*

Elatine Officinarum. Elatine folio subrotundo C. B. Park. Cat. Cant. Hist. 759.

Elatine folio acuminato Park. Cat. Cant. Linaria Elatine dicta folio acuminato Hist. 759.

Pedicularis

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, labiato, barba tripartita ; calyce amplo, vesicæ inflar inflato : vasculo bicapsulari.*

Pedicularis sive Crista galli lutea Park. Cat. Cant. Hist. 769.

Pedicularis pratensis rubra vulgaris Park. Hist. 770. Pedicularis Lob. Ger. Tab. Cat. Cant.

Euphrasia

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, labiato, galea surrecta, reflexa, quadripartita ; barba in tria segmenta bifida divisa : vasculo bicapsulari.*

Euphrasia Officinarum. Euphrasia J. B. Ger. Lob. Cat. Cant. Hist. 771.

Odontites

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, labiato,*

biato, galea integra, barba tripartita: calyce non inflato: vasculo bicapsulari.

Odontites Riv. Irr. mon. Crataegonon Euphrosynes facie Ger. Cat. Cant. Euphrasia pratensis rubra C. B. Hist. 772.

Melampyrum

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, labiato; galea fornicata & incisa; barba integra: vasculo bicapsulari.*

Melampyrum cristatum flore purpureo J. B. Cat. Cant. Hist. 775.

Melampyrum luteum latifolium C. B. Pin. 234. Melampyrum sylvaticum flore luteo sive Satureia lutea sylvestris J. B. Cat. Cant. Hist. 775.

Polygala

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, labiato; galea bifida; barba embriata: vasculo compresso.*

Polygala Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 1335.

Lentibularia

est *Herba vasculifera flore monopetalo, irregulari, rictum exprimente; vasculo unicapsulari, membranaceo.*

Lentibularia Riv. Irr. mon. Millefolium palustre galericulatum Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 1322.

Lentibularia minor Pet. H. Brit. 36. 12. Millefolium palustre galericulatum minus flore minore. The smaller hooded water Milfoil. On Teversham Moor. Flores huic multo pallidiores quam majori. Cat. Cant. App.

Orabonche

Orobanche

est *Herba vasculifera floribus monopetalis, irregularibus*
in Thyrsum dispositis : vasculo bivalvi.

Orobanche five *Rapum genistæ* Ger. Park. Cat.
Cant. Hist. 1227.

Circæa

est *Herba vasculifera floribus dipetalis, cum calyce*
bifolio, in spicam longam & laxam dispositis : vas-
culo lappaceo, bicapsulari.

Circæa Lutetiana Lob. Ger. Cat. Cant. Hist.
401.

Stellaria

est *Herba vasculifera floribus dipetalis, in foliorum*
alis : vasculis compressis.

Stellaria aquatica Lob. ico. Park. Cat. Cant. Hist.
1323.

Stratiotes

est *Herba vasculifera floribus tripetalis.*

Stratiotes five *Militaris Aizoides* Park. 1249.

Militaris aizoides Ger. Cat. Cant. Hist. 1324.

Stratiotes foliis Afari semine rotundo Gundelsb.
Morsus ranæ Ger. Dod. Ad. Lob. Cat. Cant. Nym-
phæa alba minima C. B. Hist. 1320.

GENUS XX.

HERBAE VASCULIFERAE FLORIBUS TETRA-
PETALIS NON PAPILIONACEIS.

sunt vel *siliquosæ*, vel *siliculosæ*, vel *anomala*.

Leucoium

est *Herba tetrapetala siliquosa, siliquis oblongis, com-*
pressis,

pressis, bivalvibus, membrana intergerina in duo loculamenta divisus : seminibus compressis, ala foliacea cinctis.

Leucoium luteum Officinarum. Leucoium luteum vulgare C. B. Cat. Cant. Leucoium luteum vulgo Cheiri flore simplici J. B. Hist. 782.

Draba

est *Herba tetrapetala siliquosa*, siliquis latiusculis compressis, membrana intergerina valvis parallela dissepitis : seminibus parvis, tumidioribus, nec compressis, neque ala foliacea cinctis : petalis bifidis.

Draba vulgaris caule nudo Polygoni folio hirsuto *Dillen. Cat. Giff. 40. Paronychia vulgaris Dod. Ger. Cat. Cant. Hist. 789.*

Alliaria

est *Herba tetrapetala siliquosa*, siliquis, tenuibus, a caule extantibus, quadratis, septo membranaceo in duo loculamenta divisus : seminibus oblongis teretiusculis.

Alliaria Ger. Park. J. B. C. B. Trag. Matth. Cat. Cant. Hist. 792.

Alliaria angustifolia siliquis brevioribus. *Camelina Ger. Cat. Cant. Erythrum Galeno & Theophrasto, Myagro affinis planta siliquis longis Hist. 811.*

Turritis

est *Herba tetrapetala siliquosa*, siliquis longis, cauli appressis ; teretibus aut parum compressis : seminibus ala foliacea minime cinctis.

Turritis Lob. Tab. Ger. Cat. Cant. Hist. 799.

Rapum

Rapum

est *Herba tetrapetala filiquosa*, filiqua in cornu fungosum semine prægnans desinente.

Rapum Officinarum. *Rapum* vel *Rapa* *Ang. Tur. Lac. Gesn. hort. Cat. Cant.* *Rapa sativa rotunda* *C. B. Hist.* 800.

Rapum radice oblonga *Ger. Cat. Cant.* *Rapa sativa oblonga seu femina* *C. B. Hist.* 800.

Rapum sylvestre *Ger. Matth. Cat. Cant.* *Napus sylvestris* *J. B. C. B. Hist.* 802. *Cat. Cant.*

Rapum sylvestre seminibus lucidis nigris. *Rapistrum arborum* *Ger. Lob. Park. Cat. Cant. Hist.* 802.

Sinapi

est *Herba tetrapetala filiquosa*, filiquis brevibus quadratis, cauli appressis.

Sinapi Officinarum. *Sinapi* 2. five vulgare *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 803.

Barbarea

est *Herba tetrapetala filiquosa*, filiquis teretibus, cauli appressis.

Barbarea *J. B. Dod. Lob. Tab. Ger. Cat. Cant. Hist.* 809.

Erysimum

est *Herba tetrapetala filiquosa*, filiquis brevibus angulosis, cauli appressis.

Erysimum Officinarum. *Erysimum Dioscoridis* *Dod. Gal. Cat. Cant.* *Eruca filiqua cauli appressa* *Erysimum dicta* *Hist.* 810.

Sophia

est *Herba tetrapetala filiquosa*, filiquis tenuissimis, a caule extantibus: seminibus exigais.

Sophia

Sophia Chirurgorum Officinarum. *Sophia Chirurgorum Park. Dod. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 812.*

Sophia minor præcox foliis integris. Brassica spuria minima foliis hirsutis & glabris Hist. 800. Pilosella filiquata major & minor Thal. Bursa pastoria sive Pilosella filiquosa F. B. Bursa pastoriæ similis filiquosa major & minor C. B. Paronychia major & altera minor Park. Codded Mouse-ear. In some Closes on the North-side of Gamlingay. Cat. Cant. App.

Cardamine

est Herba tetrapetala filiquosa, filiquis tenuibus valvulis per maturitatem revolutis dissilientibus, & semina cum impetu ejaculantibus.

Cardamine Officinarum. *Cardamine Ger. Cat. Cant. Hist. 814.*

Nasturtium

est Herba tetrapetala filiquosa, filiquis habitioribus, a caule extantibus, sursum nonnihil incurvis.

Nasturtium aquaticum Officinarum Cat. Cant.
Nasturtium aquaticum vulgare Park. Hist. 816.

Lepidium

est Herba tetrapetala filiculosa, filiculis hastæ cuspidi similibus; floribus albis, minimis.

Lepidium Officinarum. *Lepidium latifolium C. B. Hist. 828. Lep. Pauli F. B. Piperitis sive Lepidium vulgare Park. Raphanus sylvestris Officinarum, Lepidium Æginetæ Lobelio Ger. Dittander or Pepperwort In a little Close on the right band of Maids Causeway in the way to Barnwell. Cat. Cant. App.*

Cochlearia

Cochlearia

est *Herba tetrapetala filiculosa*, filiculis tumidis, sed nonnihil compressis; seminibus globosis.

Cochlearia folio cubitali. *Tourn Inst.* 215. *Rhaphanus rusticanus* *Ger. Lob. Offic. C. B. Cat. Cant. Hist.* 818.

Radicula

est *Herba tetrapetala filiculosa*, filiculis teretibus, a caule extantibus.

Radicula aquatica foliis in profundas lacinias divisis *Dillen. Cat. Giff. App.* 9. *Rhaphanus aquaticus* *Ger. Park. Tab. Cat. Cant. Hist.* 818.

Radicula aquatica filiculis sursum recurvis. *Eruca aquatica* *Ger. emac. Park. Cat. Cant. Hist.* 808.

Iberis

est *Herba tetrapetala filiculosa*, filicula compressa, ora foliacea cincta: flore irregulari.

Iberis petraea foliis *Bursæ pastoris* *Dillen. Cat. Giff.* 80. *Bursa pastoris minor* *Park. Tab. Cat. Cant. Nasturtium petraeum* *Tab. Ger. Hist.* 827.

Carara

est *Herba tetrapetala filiculosa*, filiculis verrucosis.

Carara *Cæs.* 8. 84. *Coronopus Ruellii* *Dod. Gal. Gesn. hort. Ger. Ludg. Cat. Cant. Hist.* 843.

Bursa pastoris

est *Herba tetrapetala filiculosa*, filicularum extremitatibus cordatis.

Bursa pastoris *Officinarum. Bursa pastoris* *f. B. Ger. Cat. Cant. Hist.* 838.

Glaſtum

est Herba tetrapetala filiculosa, filiculis latis, pendulis, monospermis.

Glaſtum Officinarum. Glaſtum fativum Ger. Park. Tur. Ad. Lob. Cam. Cat. Cant. Hist. 842.

Papaver

est Herba tetrapetala anomala, petalis amplis; calyce bifolio, caduco: vasculo operculo stellato tecto, in tot radios diviso, quot sunt in interiore cavitate lamellæ fractum in totidem velut cellas dividentes.

Papaver erraticum Officinarum. Papaver rhoeas Lob. Ger. Cat. Cant. Hist. 855.

Papaver spontaneum sylvestre Lob. Ger. emat. Cat. Cant. Hist. 854.

Glaucium

est Herba tetrapetala anomala, petalis amplis; calyce bifolio, caduco: siliqua longa unicapſulari tereti.

Glaucium flore violaceo Tourn. Inst. 254. Papaver corniculatum violaceum J. B. Park. C. B. Dod. Lugd. Cat. Cant. Hist. 857.

Chelidonium

est Herba tetrapetala anomala, petalis minoribus crucis modo dispositis; calyce bifolio, caduco: siliqua longa, unicapſulari.

Chelidonium majus Officinarum. Chelidonium majus Ger. Cat. Cant. Hist. 858.

Chamaenerion

est Herba tetrapetala anomala, siliquis per maturitatem

tatem quadrifariam dehiscentibus, & femina ostendentibus multa lanugine intertexta.

Chamænerion glabrum majus *Tourn. Inst.* 303.

Lyfimachia filiquosa glabra major *C. B. Cat. Cant.*

Lyfimachia filiquosa glabra major *Park. Hist.* 861.

Chamænerion glabrum minus *Tourn. Inst.* 303.

Lyfimachia filiquosa glabra minor *C. B. Cat. Cant.*

Lyfimachia filiquosa glabra media sive minor *Ger. emac. Hist.* 861.

Chamænerion angustifolium glabrum *Tourn. Inst.*

303. Lyfimachia filiquosa glabra minor angustifolia *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 862.

Chamænerion villosum magno flore *Tourn. Inst.*

303. Lyfimachia filiquosa hirsuta magno flore *C. B. Cat. Cant.*

Lyfimachia filiquosa hirsuta majore flore purpureo *J. B. Hist.* 861.

Chamænerion villosum parvo flore *Tourn. Inst.*

303. Lyfimachia filiquosa hirsuta parvo flore *C. B. Cat. Cant. Hist.* 861.

Pentapterophyllum

est *Herba tetrapetala anomala*, quinis in caule ad singulos nodos foliorum alis: floribus e singulis foliorum alatorum sinubus singulis.

Pentapterophyllum aquaticum flosculis ad foliorum nodos *Dillen. Cat. Giff.* 112. Millefolium aquaticum minus *Park. J. B. Cat. Cant. Hist.* 1392.

Alsinella

est *Herba tetrapetala anomala*, petalis integris, non deciduis; stylo quadrifido; calyce quadrifido: vasculo unicapsulari, per maturitatem quadrifariam dehiscente.

Alsinella muscoso flore repens *Dillen. Cat. Giff.* 81. Saxifraga graminea pusilla flore parvo herbido

vido & muscoso *Cat. Cant.* Saxifraga graminea pusilla flore parvo tetrapetalo *Hist.* 1026.

Alfinella foliis caryophylleis *Dillen. Cat.* 47. Alfine tetrapetalos Caryophylloides, quibusdam Holosteum minimum *Hist.* 1025. Holosteum minimum tetrapetalon sive Alfine tetrapetalos Caryophylloides. *The least Stitchwort.* Vere floret in glareosis sterilioribus *as nigh that gate of Gamlingay Park which is next the Town.* *Cat. Cant. App.*

GENUS XXI.

HERBAE LEGUMINOSAE.

Floris papilionaceis ab aliis omnibus facile distinguuntur.

Pisum

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata, siliquis simplicibus; non articulatis: scandens: foliis glabris, glaucis, pinnatis, pinnis ad caulem amplissimis.

Pisum arvense flore albo aut roseo fructu albedo aut cinericeo *Cat. Cant.* *Pisum* 1. 2. & 3. *Hist.* 891.

Lathyrus

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata, siliquis simplicibus; non articulatis: scandens: caulibus membranulis secundum longitudinem extantibus auctis: foliis pinnatis.

Lathyrus major latifolius *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 894.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum *J. B. Cat. Cant. Hist.* 894.

Aphaca

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata, siliquis simplicibus;

pluribus; non articulatis: scandens: foliis simplicibus, adversis.

Aphaca Lob. *Park. Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 899.

Vicia

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata, filiquis simplicibus; non articulatis: scandens: foliis pinnatis: filiquis sessilibus, erectis.

Vicia Officinarum, *Vicia* *Ger. Cat. Cant. Hist.* 900.

Vicia maxima dumetorum *Ger. emac. Park. C. B. Cat. Cant.* *Vicia* sepium perennis *J. B. Hist.* 901.

Vicia semine rotundo nigro *C. B. Pin.* 345. *Aracus* sive *Cracca* major *Lob. Ger. Park. Cat. Cant.* *Vicia* sylvestris sive *Cracca* major *Ger. Hist.* 902.

Cracca

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata: filiquis simplicibus; non articulatis: scandens: foliis pinnatis: filiquis e pediculis longis pendentibus: caulibus alis membranaceis non donatis.

Cracca Riv. Irr. tet. *Aracus* Tab. *Cat. Cant.* *Vicia* multiflora *C. B. Hist.* 903.

Cracca minor Riv. Irr. tet. *Aracus* sive *Cracca* minor *Park. Cat. Cant.* *Vicia* segetum cum filiquis plurimis hirsutis *C. B. Hist.* 902.

Cracca minor filiquis singularibus flosculis corulescentibus *Hoffm. C. H. Alt.* *Vicia* sive *Cracca* minimæ species cum filiquis glabris *J. B. Cat. Cant. Hist.* 902.

Lens

est *Herba Leguminosa*, non trifoliata: filiquis simplicibus; non articulatis: scandens: foliis pinnatis: filiquis

*siliquis brevibus; semine compresso; & pro plan-
tulæ modo grandi.*

Lens Officinarum. Lens J. B. Cat. Cant. Hist.
904.

Faba

*est Herba Leguminosa, non trifoliata; siliquis sim-
plicibus; non articulatis; non scandens; foliis pari-
ter pinnatis; caulibus angulosis, firmis, concavis;
siliquis erectis, crassis, fungosis; semine maximo,
compresso, reniformi, oblongo; cum hilo magno
in extremo.*

Faba minor Officinarum. Faba major vulgaris
Ad. Cat. Cant. Faba C. B. Hist. 909.

Faba minor Officinarum. Faba minor Ad. Lugd.
Cat. Cant. Faba minor five equina C. B. Hist. 909.

Glycyrrhiza

*est Herba Leguminosa, non trifoliata; siliquis sim-
plicibus; non articulatis; non scandens; foliis im-
pariter pinnatis; siliquis brevibus, compressis, sur-
rectis.*

Glycyrrhiza Officinarum. Glycyrrhiza vulgaris
Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 910.

Onobrychis

*est Herba Leguminosa, non trifoliata; siliquis sim-
plicibus; non articulatis; non scandens; foliis im-
pariter pinnatis; floribus spicatis spicis densis longi-
ssimis pediculis e foliorum sinubus egressis infiden-
tibus; siliquis echinatis, monospermis.*

*Onobrychis Dod. Clus. Ger. Cat. Cant. Ono-
brychis five Caput gallinaceum Ger. Hist. 914.*

Vulneraria

*est Herba Leguminosa, non trifoliata; siliquis
simplicibus.*

simplicibus : non articulatis : non scandens : foliis impariter pinnatis : siliquis calycibus in velicis membranaceas intumescens occultatis.

Vulneraria rustica J. B. 2. 362. Anthyllis leguminosa Ger. Cat. Cant. Hist. 922.

Nissolia

est Herba leguminosa, non trifoliata ; siliquis simplicibus, non articulatis : non scandens : foliis simplicibus : floribus in longis pediculis e foliorum alis exeuntibus singulis vel binis ; siliquis rectis, tenuibus, angustis.

Nissolia vulgaris Tourn Inst. 658. Catanance leguminosa quorundam J. B. Hist. 924. Ervum sylvestre Ger. Dod. sylvestre sive Catanance Park. Lathyrus V. sive sylvestris minor C. B. Crimson Grass Vetch. Found by Mr. Dent about Hadnam in the Isle of Ely. Cat. Cant. App.

Ferrum equinum

est Herba leguminosa, non trifoliata ; siliquis simplicibus, articulatis : semine ferrum equinum referente.

Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate C. B. Ger. emac. Hist. 930, equinum comosum Park. Ornithopodio affinis vel potius Soleæ aut Ferro equino herba J. B. Bush-beaded Horse-shoe Vetch. On Gogmagog-hills and the drier Part of Hinton-moor, and on Newmarket-beath, &c. Cat. Cant. App.

Ornithopodium

est Herba leguminosa, non trifoliata, siliquis simplicibus ; articulatis ; recurvis ; duabus tribusve simul nascentibus, & avicula pedes referentibus.

Ornithopodium minus Ger. *Part. C. B. Cat. Cant.*
Ornithopodium radice nodosa Park. *Hist.* 931.

Astragalus

est *Herba leguminosa*, non trifoliata, filiquis geminatis: foliis impariter pinnatis.

Astragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris sive sylvestris *Mor. Hist.* 2. 107. *Glaux vulgaris* *Ad. Lob. Clus. Cat. Cant.* *Glaux vulgaris leguminosa* sive *Glycyrrhiza sylvestris* Park. *Hist.* 935.

Astragalus incanus parvus purpureus nostras *Pluk. Alp.* 59. *Glaux montana* purpurea nostras *Hist.* 939. *Glaux Dioscoridis* Ger. *Cat. Cant.*

Trifolium

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus spicatis; spicis lanugine nulla aut rariore obstitis: filiquis in calycibus occultatis: calycibus strigosioribus & strigatis; in vesicas membranaceas non extumescen-
 bus.

Trifolium pratense album *Fuch. Dod. gal. Park. C. B. Cam. Ad. Cat. Cant. Hist.* 942.

Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis *P. B. Hist.* 942. *Dwarf Trefoil with long white Flowers. At Gamlingay by the way side as you go up from the Town to the Windmill. Cat. Cant. App.*

Trifolium pratense hirsutum majus flore albo-sulphureo *Cat. Cant. Hist.* 943.

Trifolium vulgare Officinarum. Trifolium pratense Ger. *Cat. Cant.* *Trifolium pratense purpureum* *C. B. Hist.* 943.

Trifolium pratense purpureum majus *Hist.* 944. *Trifolium majus* flore purpureo Ger. *Cat. Cant.*

Trifolium

Trifolium dilute purpureum glomerulis florum oblongis sine pediculis caulibus adnatis Cat. Cant. Trifolium parvum hirsutum flore parvo dilute purpureo in glomerulis oblongis semine magno Hist. 945.

Trifolium luteum lupinum Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 949.

Trifolium lupulinum alterum minus Cat. Cant. Hist. 949.

Cystitriphyllum

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus spicatis: calycibus in vesicas intumescens.

Cystitriphyllum palustre vulgare. Trifolium fragiferum Ger. emac. C. B. Cat. Cant. Hist. 946.

Lagopus

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus spicatis: calycibus mollibus & villosis.

Lagopus Officinarum. Lagopus vulgaris tenuifolius Hort. Hafn. Cat. Cant. Lagopus vulgaris Park. Hist. 948.

Melilotus

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus spicatis: siliquis extra calyces apparentibus, scabris aut rugosis, brevibus.

Melilotus Officinarum. Melilotus vulgaris Park. Lugd. Cat. Cant. Hist. 951.

Melilotus minor Trag. Hist. 952. Trifolium luteum minimum Ger. emac. Park. Cat. Cant.

Anonis

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus magis sparsis: siliquis habitioribus; seminibus reniformibus.

Anonis

Anonis Officinarum. *Anonis* five *Ononis* *Matth. Tab. Cat. Cant.* *Anonis* spinosa flore purpureo *C. B. Park. Hist.* 957.

Anonis non spinosa pupurea *Ger. Cat. Cant. Hist.* 937.

Medica

est *Herba leguminosa*, trifoliata, floribus magis sparsis: siliqua in cochleae formam contorta.

Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus *J. B. Hist.* 963. *Trifolium cochleatum* folio cordato maculato *C. B. Cat. Cant.*

Medica echinata minima *J. B. Hist.* 965. *Trifolium echinatum arvense* *C. B. Cat. Cant.*

Medica sylvestris *J. B. 2. 383.* *Medica frutescens* five flavo flore *Clusii Park. Hist.* 960. *Trifolium sylvestre luteum* siliqua cornuta vel *Medica frutescens* *C. B. Cat. Cant.*

Lotus

est *Herba leguminosa*, trifoliata, binis appendicibus donata, adeo ut quinquefoliata quodammodo videatur.

Lotus corniculata glabra minor *J. B. Hist.* 967. *Trifolium corniculatum primum* *Dod. Tab. Cat. Cant.*

Lotus pentaphyllos minor angustioribus foliis fruticosior *Syn.* 334. *Trifolium corniculatum minus* angustioribus foliis fruticosius *Hist.* 967. *The lesser bushy narrow-leav'd Bird's-foot Trefoil.* Inter segetes & in locis humidioribus *Cat. Cant. App.*

Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente *C. B. Hist.* 968. *Trifolium corniculatum tertium* *Dod. Cat. Cant.*

GENUS

GENUS XXII.

HERBAE PENTAPETALAE VASCULIFERAE; quibus adjunguntur nonnullae FLORIBUS HEXAPETALIS & POLYPETALIS.

Caryophyllus

est *Herba pentapetala vasculifera*, calyce duplici, interiore longo, cylindrico, laevi, margine summo dentato; exteriori brevi & squamoso: vasculo oblongo, cylindraceo.

Caryophyllus minor repens nostras *Hist.* 988. *Caryophyllus virgineus* *Ger. emac.* Maiden Pinks. On a little Hill or Brow whereon Furze grows, beyond Hilderham near Juniper Hill. *Cat. Cant. App.*

Lychnis

est *Herba pentapetala vasculifera*, sexu diversa in diversis plantis: petalis bifidis, appendicibus in medio donatis, corollam in medio floris fingentibus; calyce unifolio, longo, striato: vasculo pyriformi.

Lychnis sylvestris flore albo *Ger. emac. Chus. Lon. Park. Cat. Cant. Hist.* 994.

Lychnis flore albo minimo *Hist.* 996. *Lychnis sylvestris* annua angustifolia flore rubente. Among the Corn near the Devil's Ditch on Newmarket-beach. *Cat. Cant. App.*

Pseudomelantium

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus androgynis, nulla corolla donatis; petalis leviter cordatis; calyce

calyce unifolio, tubuloso, nonnihil inflato, striato, in quinque segmenta angusta, longitudine petala multum superantia diviso.

Pseudomelanthium Ger. *Matth. J. B. Cat. Cant.*
Lychnis segetum major C. B. *Hist.* 998.

Flos cuculi

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus androgynis; petalis cum corolla laciniatis; calyce unifolio tubuloso, nonnihil striato.

Flos cuculi pratensis Trag. *Armerius sylvestris* Dod. *Cat. Cant.* *Lychnis plumaria sylvestris simplex* Park. *Hist.* 1000.

Muscipula

est *Herba pentapetala vasculifera*, sexu diversa in diversis plantis; calyce tubuloso, nonnihil inflato: vasculo tricapulari.

Muscipula Salamantica major Park. *Sesamoides Salamanticum magnum* Ger. *Clus. Cat. Cant.* *Lychnis viscosa flore muscoso* C. B. *Hist.* 1002.

Behen

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus androgynis; calyce vesicæ instar inflato: vasculo tricapulari.

Behen album Officinarum. *Behen album Officin.* Ger. *Cat. Cant.* *Lychnis sylvestris quæ Ben album vulgo* C. B. *Hist.* 998.

Saponaria

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus androgynis; petalis nec laciniatis neque bifidis; calyce tenui, longo, non striato.

Saponaria

Saponaria Officinarum. Saponaria Dod. Lob.
 Ger. Cat. Cant. Hist. 999.

Helianthemum

est *Herba pentapetala vasculifera*, calycibus trifoliis, ad modum petalorum expansis: vasculo trigono, in tres carinas dehiscente.

Helianthemum vulgare flore luteo *J. B.* 2. 15.
Chamæcistus vulgaris flore luteo *C. B. Cat. Cant. Hist.* 1013.

Hypericum

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus stamino-
 sis; ovario triplici stylo donato: vasculo tricapsu-
 lari.

Hypericum minus, erectum *Park. Cat. Cant. Hist.* 1019.

Hypericum Officinarum. *Hypericum Ger. Matth. Fuch. Dod. Lob. Cas. Lugd. Cam. Tab. Cat. Cant. Hist.* 1018.

Hypericum Ascyron dictum caule quadrangulo
J. B. 3. 382. *Ascyron Ger. Cat. Cant. Hist.* 1019.

Hypericum palustre supinum tomentosum Tourn. Inst. 255. *Ascyrum supinum villosum palustre C. B. Park. Cat. Cant. Hist.* 1020.

Hypericum majus five *Androsæmum Matthioli Hist.* 1020. *Hyp. Androsæmum* dictum *J. B.* *Androsæmum Hypericoides Ger.* alterum foliis *Hyperici* quod aliquibus *Hypericoides C. B. Tutsan St. John's wort.* In dumetis & sepibus passim *Cat. Cant. App.*

Hypericum minus supinum Park. Hist. 1019. *minimum supinum J. B.* *minus supinum vel supinum glabrum C. B. supinum glabrum Ger. Small creeping St. John's wort. On the first Hill next Hilder-
 sham towards Juniper hill. Cat. Cant. App.*

Alfine

Alfne

est *Herba pentapetala vasculifera*, petalis ad medium bifidis; calyce quinquefolio, expanso: vasculo membranaceo, unicapsulari, conico aut subrotundo; his notis addi possunt folia conjugata: caulibus bifariam divisus & subdivisus: ad singulas ramorum divisiones ex ipso angulo pediculus prodicens flore unico terminatus.

Alfne aquatica major C. B. Cat. Cant. Alfne major repens perennis J. B. Hist. 1030.

Alfne longifolia uliginosis proveniens locis J. B. Cat. Cant. Hist. 1030.

Alfne Officinarum. Alfne media Dod. Ger. Cat. Cant. Alfne vulgaris sive Morfus gallinae J. B. Hist. 1030.

Alfne pratensis gramineo folio ampliore Tourn. Inst. 243. Holosteum vernum flore majore P. B. Cat. Cant. Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore majore C. B. Hist. 1027.

Alfne pratensis gramineo folio angustiore Tourn. Inst. 243. Holostei Ruellii diversitas Lob. ito. Cat. Cant. Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore minore C. B. Hist. 1027.

Myosotis

est *Herba pentapetala vasculifera*, petalis bifidis; calyce quinquefolio, expanso: vasculo membranaceo, unicapsulari, cornu bovino simili.

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore Tourn. Inst. 245. Alfne hirsuta myosotis Ad. Cat. Cant. Hist. 1029.

Myosotis arvensis subhirsuta flore majore Tourn. Inst. 245. Auricula muris pulchro flore albo J. B. 3. 360. Caryophyllus holosteus Ger. Hist. 1027.

Myosotis

Myosotis hirsuta altera viscosa Tourn. Inst. 245.
Alfina viscosa Park. Hist. 1029. *Alfina hirsuta*
altera viscosa C. B. spuria 4. Dod. The broader
leav'd Mouse-ear Chickweed. Floret circa finem
 Aprilis & initio Maii & postea brevi marcescit
Cat. Cant. App.

Spergula

est *Herba pentapetala vasculifera*, petalis integris ;
 calyce quinquefolio, expanso ; vasculo membrana-
 ceo, unicapsulari.

Spergula *J. B. Cat. Cant. Hist. 1034.*

Spergula purpurea *J. B. Hist. 1034.* *Spergu-*
la alfineformis Ger. emac. Cat. Cant.

Spergula marina Dalechampii Ger. emac. Cat.
Cant. Spergula marina nostras J. B. Hist. 1034.

Spergula multicaulis Dillen. Cat. Giff. 58. *Al-*
fine minor multicaulis C. B. Cat. Cant. Hist.
1031.

Spergula minor foliis Knawel flore majusculo
albo Dillen. Cat. Giff. 156. *Alfina palustris foliis*
tenuissimis sive Saxifraga palustris alfinefolia Ger.
emac. Cat. Cant. Saxifraga palustris Anglice Park.
Hist. 1032.

Spergula tenuifolia elatior. Alfina tenuifolia
J. B. Cat. Cant. Hist. 1031.

Spergula Plantaginis folio Dillen. Cat. Giff. 58.
Alfina Plantaginis folio J. B. Hist. 1032. *Plan-*
tain leav'd Chickweed. Floret vere. Ad sepes, &
 in dumetis uliginosis præsertim : *Especially about*
Balsam. Cat. Cant. App.

Saxifraga

est *Herba pentapetala vasculifera*, vasculo bicorni
 & bicapsulari, calyci ad mediam usque partem
 connato, subrotundo.

Saxifraga

Saxifraga alba Officinarum. *Saxifraga alba Ger.*
Dod. Fuch. Gesn. Cam. Tab. Cat. Cant. Hist. 1048.

Saxifraga verna annua humilior Tourn. Inst. 252.

Paronychia rutaceo folio Ger. Lob. Cat. Cant.

Sedum tridactylites testorum C. B. Hist. 1043.

Parnassia

est *Herba pentapetala vasculifera*, floribus in singulis caulibus singulis, speciosis; duum generum staminibus.

Parnassia vulgaris & palustris Tourn. Inst. 246.
Gramen Parnassi Dod. Lob. ico. Ger. Cat. Cant. Hist. 1049.

Geranium

est *Herba pentapetala vasculifera*, vasculo pentacocco vel hexacocco.

Geranium Cicutæ folio inodorum Ger. Hist. 1057. *Geranium arvense vel minus Tab. Cat. Cant.*

Geranium batrachoides Dod. Cam. Thal. Lugd. J. B. Cat. Cant. Hist. 1061.

Geranium columbinum Officinarum. Geranium columbinum Tab. Ger. Cat. Cant. Hist. 1059.

Geranium columbinum majus dissectis foliis Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 1059.

Geranium malacoides sive columbinum minimum Park. Cat. Cant.

Geranium hæmatodes Thal. Cam. Park. Cat. Cant. Hist. 1061.

Geranium Robertianum Officinarum. Geranium Robertianum Ad. Lob. Dod. Cam. Tab. Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 1058.

Geranium saxatile Ger. emac. Cam. Park. Cat. Cant. Hist. 1060.

Linum

Linum

Ger. 48. est *Herba pentapetala vasculifera*, vasculo in decem capsulas diviso, totidem semina continentes.

252. *Linum Officinarum*. *Linum sativum* Ger. *emac.*
Cant. Park. Dod. C. B. Cat. Cant. Hist. 1072.

13. *Linum sylvestre cœruleum perenne nostras* Hist. 1073.

ingu- *Linum sylvestre radice perenni flore cœruleo*
sta- hort. Bat. Cat. Cant.

246. *Linum catharticum Officinarum*. *Linum syl-*
Cant. vestre catharticum Ger. *emac.* Cat. Cant. Hist. 1076.

Ros Solis

enta- est *Herba pentapetala vasculifera*, foliis setis ruben-
Hist. tibus circumquaque fimbriatis, quibus guttulæ ve-
Cat. lut roris adhærescunt : caulibus nudis, flores
longa serie gestantibus ; calyce oblongo, in quin-
que segmenta diviso : vasculis oblongis.

ugd. *Ros solis Officinarum*. *Ros solis folio rotundo*
Ger. C. B. Park. J. B. Cat. Cant. Hist. 1100

ium *Ros solis folio oblongo* C. B. J. B. Ger. Hist.
Ger. 1100. *Rorella* sive *Ros solis foliis oblongis* J. B.
Park. Cat. Cant.

Viola

ini- est *Herba pentapetala vasculifera*, flore irregulari,
Cat. caudato : vasculo trifariam dehiscente.

ani- *Viola martia Officinarum*. *Viola nigra* seu pur-
Ger. purea Ger. Cat. Cant. *Viola Martia purpurea*.
J. B. Ger. Hist. 1049.

Cat. *Viola martia alba* C. B. Cat. Cant. Hist. 1050.

um *Viola canina sylvestris* Ger. Trag. Cat. Cant.
Viola martia inodora sylvestris C. B. Hist. 1050.

Viola bicolor arvensis C. B. *Hist.* 1053. *Viola tricolor* Dod. *Clus. Ger. Cat. Cant.*

Salicaria

est *Herba hexapetala vasculifera*, petalis e summo margine calycis tubulosi exeuntibus.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis *Tourn. Inst.* 253. *Lyfimachia purpurea* Lob. *Caf. Cam. Tab. Cat. Cant. Hist.* 1036.

Salicaria trifolia, caule hexagono, flore purpureo. *Lyfimachia purpurea trifolia* caule hexagono *Spigel. Cat. Cant.*

Salicaria Hyssopi folio *Tourn. Inst.* 253. *Gratiola angustifolia* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 1055.

Portula

est *Herba hexapetala vasculifera*, vasculis subrotundis, in singulis foliorum alis singulis.

Portula Dillen. Cat. Giff. 120. *Aline rotundifolia* sive *Portulaca aquatica* *Ger. emac. Hist.* 1034. *aquat. minor folio oblongo* sive *Portulaca aquatica* *Park. palustris minor folio oblongo* C. B. *Water Purslane. In the wet grounds nigh Gamlingay Park. Cat. Cant. App.*

Nymphæa

est *Herba polypetala vasculifera*, calyce quinquefolio: vasculo multicapsulari, urceum referente.

Nymphæa lutea *Officinarum. Nymphæa lutea* *Ger. J. B. Cat. Cant. Hist.* 1319.

Nenuphar

est *Herba polypetala vasculifera*; calyce quadrifolio: vasculo quinquecapsulari.

Nenuphar

Nenuphar album Officinarum. Nymphaea alba
Ger. F. B. Cat. Cant. Hist. 1320.

Herbæ monocotyledones florem habent vel petaloden vel apetalum.

GENUS XXIII.

HERBAE MONOCOTYLEDONES FLORE
PETAŁODE, VASCULO TRICAPSU-
LARI seu marvis BULBACEAE.

Hyacinthus

Hyacinthus est Herba bulbacea, flore monopetalo, in sex segmenta ad unguem diviso; nudo: caule nudo: vasculo non umbilicato.

Hyacinthus Officinarum. Hyacinthus Anglicus
Ger. Ad. Lob. Cat. Cant. Hist. 1159.

Crocus

est Herba bulbacea, flore monopetalo, e tubo longo in sex segmenta inæqualia expanso, tubuloso: vasculo umbilicato.

Crocus Officinarum. Crocus F. B. Tur. Trag.
Dod. Lob. Cat. Cant. Hist. 1176.

Narcissus

est Herba bulbacea, flore monopetalo, in sex segmenta diviso, tubo calyceem referente in medio donato.

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo C. B.
Hist. 1131. Narcissus pallido-luteus longo calyce
sive sylvestris Anglicus Hort. Bat. Cat. Cant.

Narcissus medio-luteus vulgaris Hist. 1135.

Narcissus medio-luteus Ger. *Dod. pallidus circulo luteo* C. B. *Primrose peerless, or the common white Daffodil.* In *Barnwell-Abby*, and other places in this County Cat. Cant. App.

Iris

est *Herba bulbacea*, flore monopetalo, in sex segmenta ad unguem diviso : stylo in tria folia petalorum æmula expanso.

Iris lutea *Officinarum.* *Acorus palustris* Lob. Cat. Cant. *Iris palustris lutea* Ger. *Hist.* 1186.

Iris sylvestris quam *Xyrim* vocant *Plin. Syn.* 375. *Xyris* *Matth. Lob. Lugd. Ger. Cat. Cant. Hist.* 1190.

Phalangium

est *Herba Bulbacea*, floribus hexapetalis, stellatis, in spicas dispositis : radicibus fibrosis.

Phalangium Anglicum palustre *Iridis folio* *Tourn. Inst.* 1368. *Pseudoasphodelus minor* sive *pumilio folio Iridis* sive 2. *Clus. Hist.* 1194. *Asphodelus Lancastriæ* Ger. *luteus acorifolius palustris Anglicus Lobelii J. B.* *Pseudoasphodelus primus* *Clus.* major sive *palustris Park.* *palustris Anglicus C. B.* *Lancashire Asphodel; or Bastard Asphodel.* In the first Bog nigh the Park at *Gamlingay.* Cat. Cant. App.

Ornithogalum

est *Herba bulbacea*, floribus hexapetalis stellatis; staminibus latis, quorum tria sunt acuminata, tria bifida.

Ornithogalum angustifolium majus floribus ex albo virescentibus C. B. *Hist.* 1151. *Asphodelus bulbosus* Ger. *bulbosus Dodonæi* sive *Ornithogalum spicatum* flore virente J. B. *Spiked Star of Bethlehem*

lehem with a greenish flower. In a bushy Close in little Eversden near the Church. Cat. Cant. App.

Cepa

est *Herba bulbacea*, floribus hexapetalis, ex perianthio erumpentibus, atque in corymbum diffusis : foliis fistulosis.

Cepa juncifolia minor purpurascens Tourn. Inst. 383. Allium sylvestre Park. Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 1117.

Allium

est *Herba bulbacea*, floribus hexapetalis, e perianthio erumpentibus, atque in corymbum aut umbellam diffusis : foliis planis, non fistulosis.

Allium sylvestre latifolium C. B. Cat. Cant. Hist. 1122.

Hiscæ adjunguntur *Herbæ quædam Bulbaceis affines*, quarum *vascula* quamvis *tricapsularia* non sint, tribus tamen carinis componuntur & sex seminum ordines continent.

Orchis

est *Herba bulbaceis affinis* ; floribus hexapetalis, spicatis ; radice testiculata aut palmata.

Orchis morio mas foliis maculatis Park. C. B. Cat. Cant. Hist. 1214.

Orchis morio foemina Park. Cat. Cant. Hist. 1214.

Orchis myodes Ger. Cat. Cant. Orchis myodes galea & alis herbidis J. B. Hist. 1219.

Orchis palmata non maculata J. B. Hist 1223. Orchis palmata major mas sive Palma Christi mas Park. Cat. Cant.

Orchis palmata speciosiore thyrso folio maculato

J. B. Hist. 1223. *Orchis palmata foemina* five *Palma Christi foemina maculato folio* *Park. Cat. Cant.*

Orchis palmata rubella cum longis calcaribus rubellis *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1224.

Orchis palmata flore luteo-viridi *Hist.* 1224.

Orchis palmata flore viridi *Park. C. B. Cat. Cant.*

Orchis Pannonica 4. *Clus. Hist.* 1215. *Orchis* five *Cynosorchis minor Pannonica* *Ger. Cat. Cant.*

Orchis purpurea spica congesta pyramidalis *Hist.* 1215. *Orchis* five *Cynosorchis purpurea* &c. *Cat. Cant.*

Orchis Serapias bifolia vel trifolia minor *Park. Cat. Cant.* *Orchis alba calcaribus oblongis* *J. B. Hist.* 1221.

Orchis fuciflora galea & alis purpurascens *J. B. Hist.* 1220. *Orchis sphegodes* five *Fucum* referens *Park. Cat. Cant.*

Orchis five *Testiculus sphegodes hirsuto flore* *J. B. Hist.* 1221. *Serapias IX.* five *fucum* referens colore rubiginoso *C. B.* *The green-wing'd Humble-Bee Orchis.* *In an old Gravel-pit near Shelsford by the Foot-way from Trumpington to the Church plentifully.* Floret circa finem Aprilis & initium Maii. *Cat. Cant. App.*

Orchis odorata moschata five *Monorchis* *C. B. Hist.* 1217. *Orchis pusilla alba odorata* *Park.* parva Autumnalis lutea *J. B.* *The sweet yellow Musk Orchis.* *In the Chalk-pit Close at Cherry-Hinton, and in some Pits not far from thence about Gogmagog-hills.* *Cat. Cant. App.*

Orchis spiralis alba odorata *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1217.

Pseudo-Orchis

est ~~Herba~~ *bulbaceis affinis*, floribus irregularibus, hexapetalis; radice squamosa,

Pseudo-

Pseudo-Orchis bifolia palustris *Hist.* 1226. *Orchis lilifolius minor fabuletorum Zelandiæ & Bataviæ* *J. B. Cat. Cant.*

Helleborine

est *Herba bulbaceis affinis*, floribus irregularibus, hexapetalis: calcaribus carentibus: foliis nervosis: radice fibrosa.

Helleborine palustris nostras *Hist.* 1231. *Helleborine angustifolia* *Tab. Ger. Cat. Cant.*

Helleborine latifolia montana *C. B. Cat. Cant. Hist.* 1230.

Helleborine flore albo *C. B. Ger. Hist.* 1231. *Helleborine minor flore albo* *Park. Narrow-leav'd Bastard white Hellebore with white Flowers. On Teversham-moor nigh Qui-water. Cat. Cant. App.*

Ophrys

est *Herba bulbaceis affinis*, floribus irregularibus, hexapetalis, calcaribus carentibus: foliis plantagineis; binis in caule oppositis: radice fibrosa.

Ophrys *Matth. Cat. Cant.* *Bifolium majus* sive *Ophrys major* quibusdam *J. B. Hist.* 1232.

Ophrys minor palustris. Bifolium palustre *Park. Hist.* 1233. *Found by Mr. Dent and Mr. Dale in Company on the boggy and fenny Grounds near Gamlingay. Syn.* 385.

GENUS XXIV.

HERBAE MONOCOTYLEDONES FLORE
APETALO, seu *mavis* CEREALES.

Triticum

est *Herba cerealis*, spicata, locustis alternatim scapo adnatis, ex calyce biglumi, & folliculis biglumibus axi alternatim adnatis, compositis.

Triticum Officinarum. *Triticum spica mutica*
Ger. Park. Hist. 1236. *Cat. Cant.*

Triticum aristis munitum rubentibus granis & spica glumis lævibus & splendentibus *Hist.* 1238.
Triticum aristis munitum & spica & granis rufescentibus glumis præ cæteris aristatis lævibus & splendentibus *Cat. Cant.*

Triticum aristatum spica maxima cinericea glumis hirsutis *Hist.* 1238. *Triticum aristis circumvallatum glumis hirsutis spica albicante* *Cat. Cant.*

Triticum sylvestre radice repente quod Gramen caninum Officinarum. *Gramen caninum* *Ger. Cat. Cant.* *Gramen repens Officinarum* forte spicæ triticeæ aliquatenus simile *J. B. Hist.* 1255.

Secale

est *Herba cerealis*, spicata, locustis duabus, simplicibus, biglumibus, nudis, unicuique scapi denticulo innatis, eidem basi insidentibus & sibi invicem juxtapositis.

Secale Officinarum, *Secale* *Matth. Tab. Lob. Ger. Cat. Cant. Hist.* 1241.

Hordeum

Hordeum

est *Herba cerealis*, spicata, locustis unicuique scapi denticulo innatis, ex duabus aut tribus folliculis biglumibus quorum gluma alterutra in aristam abit, & calyce biglumi aristato compositis.

Hordeum Offinarum. *Hordeum distichum* Ger. Park. J. B. Cat. Cant. Hist. 1243.

Hordeum distichum spica brevior & latior granis confertis Hist. 1243. *Hordeum distichum minus* Park. Cat. Cant.

Hordeum polystichum J. B. Tur. Cat. Cant. Hist. 1244.

Hordeum murinum Cæs. 4, 58. *Hordeum spurium* Park. Ger. Tab. Cat. Cant. *Gramen secalinum* & *Secale sylvestre Johnsoni* apud Gerardum Hist. 1258.

Lolium

est *Herba cerealis*, spicata, locustis scapi denticulis alternatim in eodem plano adnatis.

Lolium album Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 1262.

Lolium rubrum Ger. Cat. Cant. *Gramen lolium angustiore folio* & spica C. B. Hist. 1263.

Lolium pratense glumis cristatis. *Gramen alopecuroides minus* spica aspera brevi Park. Cat. Cant. *Gramen cristatum* J. B. Hist. 1269.

Alopecuroides

est *Herba cerealis*, spicata, spica tenui: locustis aristatis non bicornibus, e folliculo uniglumi aut biglumi, & calyce biglumi mutico compositis.

Alopecuroides minus spica longa gracili aristis rectis. *Gramen Alopecuroides minus* Ger. Cat. Cant. Hist. 1265.

Alopecuroides

Alopecuroides aquaticum procumbens spica gracili brevior. Gramen aquaticum spicatum *Lob. ico. Cat. Cant.* Gramen aquaticum geniculatum spicatum *C. B. Hist.* 1264.

Typhoides

est *Herba cerealis*, spicata, spica cylindracea: locustis e folliculo biglumi & calyce biglumi, glumis in aristam brevem abeuntibus, adeo ut locusta bicornis efficiatur.

Typhoides maximum spica longissima. Gramen typhinum maximum *Park. Cat. Cant.* Gramen typhinum majus seu primum *Hist.* 1267.

Typhoides minus spica brevior. Gramen typhinum medium sive vulgatissimum *Park. Cat. Cant.* Gramen typhinum minus *Ger. Park. Hist.* 1267.

Spartum

est *Herba cerealis*, spicata, spica angustissima heteromalla, composita e locustis nudis, biglumibus, angustis, aristatis.

Spartum parvum *Lobelio f. B. Cat. Cant.* Gramen *Sparteum juncifolium C. B. Hist.* 1260.

Calamagrostis

est *Herba cerealis*, spica multiplici; locustis simplicibus; e folliculo biglumi mutico, & calyce etiam biglumi & mutico conflatis.

Calamagrostis aquatica vulgaris. Gramen arundinaceum acerofa gluma nostras *Park. Cat. Cant. Hist.* 1280.

Hippagrostis

est *Herba cerealis*, spica multiplici; locustis compositis, aristatis,

Hippagrostis

Hippagrostis vulgaris folio aspero. Gramen asperum *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1287.

Arundo

est *Herba cerealis*, paniculata; locustis e folliculis muticis, & calyce biglumi, mutico, compositis, lanuginosis.

Arundo Officinarum. *Arundo vallatoria Ger. Lob. Cat. Cant. Hist.* 1275.

Milium

est *Herba cerealis*, paniculata; locustis simplicibus; calyce biglumi mutico.

Milium sylvestre panicula speciosa. Gramen paniculatum arvense *C. B. Cat. Cant.* Gramen segetum panicula speciosa *Park. Hist.* 1283.

Milium montanum panicula spadicea delicatiore. Gramen montanum panicula spadicea delicatiore *C. B. J. B. Cat. Cant.*

Avena

est *Herba cerealis*, paniculata; locustis compositis, calyce biglumi donatis, aristatis; aristis recurvis.

Avena alba J. B. Hist. 1253. *Avena Matth. Fuch. Dod. Tur. Cat. Cant.*

Avena nigra C. B. J. B. Dod. Cat. Cant. Hist. 1253.

Avena spuria elatior panicula speciosa. *Ægilops bromoides Ger. emac. Cat. Cant.* *Ægilops* quibusdam aristis recurvis sive *Avena pilosa J. B. Hist.* 1254.

Avena pratensis tomentosa. Gramen pratense paniculatum molle *C. B. Park. Cat. Cant. Hist.* 1285.

Eragrostis

Eragrostis

est *Herba cerealis*, paniculata; locustis e folliculis muticis glabris & calyce biglumi, mutico compositis.

Eragrostis pratensis major vulgaris, Gramen pratense *Ger. Cat. Cant.* Gramen pratense paniculatum majus *C. B. Hist.* 1285.

Eragrostis pratensis minor vulgaris, Gramen pratense paniculatum minus *C. B. Cat. Cant.* Gramen pratense minus seu vulgatissimum *Hist.* 1284.

Eragrostis major latifolia aquatica, Gramen aquaticum majus *Ger. emac. Lob. ico. Cat. Cant.* Gramen harundinaceum aquaticum *Park. Hist.* 1280.

Eragrostis aquatica elatior locustis quasi in spicas digestis, Gramen aquaticum cum longissima panicula *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1281.

Eragrostis pratensis major locustis tremulis, Gramen tremulum *J. B. Cat. Cant. Hist.* 1274.

Festuca

est *Herba cerealis*, paniculata, locustis compositis, calyce biglumi donatis, aristatis, aristis rectis.

Festuca avenacea sterilis elatior *C. B. Hist.* 1289, *Festuca* & *Avena* Græca *Lon. Cat. Cant.*

Festuca altera *Dod. Cat. Cant.* *Festuca* graminea spicis habitioribus glumis glabris *Hist.* 1289.

Cyperus

est *Herba cerealis*, culmo triquetro, panicula e pluribus spicis confertis composita.

Cyperus longus inodorus latifolius spicis tumidoribus minus sparsis *H. Ox.* 3. 238. Gramen cype-
roides

roides palustre panicula sparsa Park. Cat. Cant. Hist. 1296.

Cyperus minor palustris hirsutus paniculis albis paleaceis H. Ox. 3. 239. Gramen junceum leucanthemum Ger. emac. Boggy Rush-grass with white chaffy Heads. On a boggy Ground near Gamlingay Park. Cat. Cant. App.

Cyperoides

est *Herba cerealis*, culmo triquetro, spicis sexu diversis in eadem planta.

Cyperoides latifolium spica rufa sive caule triangulo Tourn. Inst. 529. Gramen cyperoides cum paniculis nigris F. B. Cat. Cant. Hist. 1293.

Cyperoides nigro-luteum vernum majus Tourn. Inst. 529. Gramen cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi C. B. Cat. Cant. Gramen cyperoides majus angustifolium Park. Hist. 1293.

Cyperoides nigro-luteum vernum minus Tourn. Inst. 529. Gramen nigro-luteum vernum F. B. Cat. Cant. Gramen cyperoides foliis caryophylleis vulgatissimum Hist. 1293.

Cyperoides spica pendula longiore & angustiore Tourn. Inst. 529. Gramen cyperoides spica pendula longiore Park. Hist. 1294. sp. pend. longiore & angustiore C. B. F. B. In the great Ditch at the End of the little Thicket adjoining to Teversham-moor, and in other great Ditches. Cat. Cant. App.

Cyperoides sylvarum tenuius spicatum Tourn. Inst. 530. Gramen cyperoides sylvarum tenuius spicatum Park. Lob. Cat. Cant. Hist. 1295.

Cyperoides palustre aculeatum panicula brevior Tourn. Inst. 529. Gramen palustre echinatum F. B. Lob. Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 1296.

Scirpoides

Scirpoides

est *Herba cerealis*, culmo triquetro, floribus sexu diversis in eadem spica.

Scirpoides palustre majus spica compacta *Mont. Prod. 17.* Gramen cyperoides palustre majus spica compacta *C. B. Cat. Cant. Hist. 1297.*

Scirpoides palustre minus spicis minoribus minusque compactis. Gramen cyperoides palustre minus *Park. Cat. Cant.* Gramen cyperoides spicatum minus *Hist. 1297.*

Scirpoides spica ex pluribus spicis composita *Mont. Prod. 18.* Gramen cyperoides ex monte Ballon spica divulsa *J. B. Cat. Cant. Hist. 1296.*

Scirpoides angustifolium spicis sessilibus in foliorum alis. Gramen *Cyperoides angustifolium*, &c. *Hist. 1295.* Gramen *Cyperoides angustifolium* paniculis plurimis sessilibus in foliorum alis. *Narrow leav'd Cyperus grass with small panicles. On the banks of many ditches.* Unicuique panicula subest folium longum. *Cat. Cant. App.*

Pseudo-Cyperus.

est *Herba Cerealis*, culmo tereti, panicula e locustis angustis, mucronatis, squamosis, composita.

Pseudo-Cyperus palustris foliis & carina ferratis *Scheuch. Agrost. 375.* *Cyperus longus* inodorus sylvestris *Ger. Cat. Cant. Hist. 1300.*

Scirpus

est *Herba cerealis*, culmo tereti atque enodi floribus in capitulum squamosum collectis.

Scirpus palustris altissimus *Tourn. Inst. 528.* *Juncus aquaticus* maximus *Ger. Ad. Lob. ico. Cat. Cant. Hist. 1304.*

Scirpus

Scirpus Equiseti capitulo majori *Tourn. Inst.* 528. Juncus aquaticus minor capitulis Equiseti *Lob. ico. Ger. Park. Cat. Cant.* Juncus capitulis Equiseti *C. B. Hist.* 1305.

Scirpus palustris capitulo nigricante semine splendente. Juncus palustris panicula glomerata ex rubro nigricante *Cat. Cant.* Juncus lævis panicula glomerata nigricante *C. B. Hist.* 1305.

Scirpus foliaceus humilis *Dillen. Cat. Giff.* 158. Juncellus omnium minimus *Chamæschænos Ad. Lob. Hist.* 1305. Juncus humilis *J. B. The least Rush.* Palmarem altitudinem nunquam assequitur, paniculam tamen profert eadem fere forma qua Juncus aquaticus maximus. *In Gamlingay Park, and many other watry places thereabouts. Cat. Cant. App.*

Juncus

est *Herba cerealis*, culmo tereti, flore hexaphyllo: vasculo triquetro.

Juncus acutus *Ger. Cat. Cant. Hist.* 1303.

Juncus lævis vulgator panicula sparsa *Lob. ico. Cat. Cant.* Juncus lævis vulgaris panicula sparsa nostras *Hist.* 1304.

Juncus lævis panicula non sparsa *C. B. Cat. Cant.* Juncus lævis vulgaris panicula compactiore *Hist.* 1304.

Juncus villosus capitulis Psyllii *Tourn. Inst.* 246. Gramen exile hirsutum *Ger. Cat. Cant. Hist.* 1291.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis *J. B. 2. 522.* Gramen juncum maritimum *Lob. ico. Ger. Cat. Cant. Hist.* 1307.

Juncus palustris humilior erectus *Tourn. Inst.* 546. Gramen juncum *Ger. Cat. Cant.* Gramen juncum parvum sive *Holosteum Matthioli* & Gramen bufonium *Flandrorum Park. Hist.* 1309.

Juncus

Juncus montanus palustris *Hist.* 1303. *Juncus acutus* Cambro-Britannicus *Park. Moss-rush, Goose-corn.* Upon all the boggy and beaty Grounds about *Gamlingay.* *Cat. Cant. App.*

Juncus foliis articulosis floribus umbellatis *Tourn. Inst.* 247. *Gramen junceum aquaticum* *Baubini Park. Cat. Cant.* *Gramen junceum folio articulato aquaticum* *C. B. Hist.* 1307.

Juncus nemorosus folio articulofo *Tourn. Inst.* 247. *Gramen junceum aquaticum magis sparsa panicula* *Park. Cat. Cant. Hist.* 1307.

Juncus minor angustifolius panicula sparsa. *Gramen junceum capsulis triangulis minimum* *Hist.* 1307. *Graminis juncei varietas minor* *Ger. emac.* In some wet places of the Heath between *Gamlingay* and *Potton.* *Cat. Cant. App.*

Juncago

est *Herba cerealis*, culmo tereti, flore hexaphyllo; vasculo oblongo, in basi dehiscente, ex tribus vaginulis composito; quæ singulæ semen complectuntur singulare, oblongum.

Juncago palustris & vulgaris *Tourn. Inst.* 266. *Gramen marinum spicatum* *Ger. emac. Cat. Cant.* *Gramen junceum spicatum seu triglochin* *C. B. Hist.* 1308.

Linagrostis

est *Herba cerealis*, spicis squamosis, tomentosus.

Linagrostis panicula ampliore *Tourn. Inst.* 664. *Gramen tomentosum & Linagrostis* *Tab. Cat. Cant.* *Gramen pratense tomentosum panicula sparsa* *C. B. Hist.* 1307.

Typha

est *Herba cerealis*, spicis teretibus, sexu diversis, mascula supra feminam in eadem planta posita.

Typha

Typha Ger. *Matth. Fuch. Lob. Tab. Cat. Cant.*
Hist. 1312.

Sparganium

est *Herba cerealis*, sexu diversa in diversis plantis ;
 feminibus in pilulas sphaericas, echinatas conglobatis.

Sparganium ramosum Park. Ger. C. B. Cat. Cant.
Hist. 1311.

Sparganium non ramosum C. B. Park. Cat. Cant.
Hist. 1311.

Plantæ gemmiparæ *Arbores & Frutices* dictæ
 sunt vel *monocotyledones* vel *dicotyledones*.

GENUS XXV

Arbores monocotyledones continet ; quarum
 nullæ in Anglia sponte proveniunt.

Arbores Dicotyledones Flores habent vel sexu di-
 versos, vel androgynos. Quæ flores habent sexu di-
 versos, fructum habent vel squamosum vel non
 squamosum.

GENUS XXVI

Arbores floribus sexu diversis, fructu squamoso,
CONIFERÆ dictæ.

Betula

est *Arbor Conifera*, non resinifera, folio *Populi* de-
 ciduo.

Betula Officinarum. *Betula* Ger. Park. C. B.
Sc. Cat. Cant. Hist. 1410.

Alnus

est *Arbor Conifera*, non resinifera, folio *Coryli* deci-
 duo.

Ainus Ger. *Matth.* *Dod.* *Tur.* *Lob.* *Cal.* *Cant.*
Hist. 1409.

GENUS XXVII.

**ARBORES FLORIBUS SEXU DIVERSIS,
 FRUCTU NON SQUAMOSO.**

Nux

est *Arbor floribus sexu diversis fructu non squamosa*;
 julifera; nucifera; tegumento nucis exteriore
 crasso, pulvinato, nucem undique tegente; nucleo
 in quatuor lobos profunde diviso; foliis pinnatis.

Nux Juglans J. B. Ger. *Hist.* 1376. *Juglans*
nux sive regia vulgaris C. B. *Cal.* *Cant.*

Corylus

est *Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamo-*
so; julifera; nucifera; tegumento nucis exteriore
 membranaceo; summa parte aperto; nucleo in-
 diviso; foliis integris, subrotundis.

Corylus Officinarum. *Corylus sylvestris* C. B.
Trag. *Matth.* Ger. *Cal.* *Cant.* *Corylus sativa* J. B.
 item *sylvestris* *Hist.* 1379.

Carpinus

est *Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamo-*
so; julifera; nucifera; putamine fructus alato;
 foliis *Ulmis*.

Carpinus *Matth.* *Betulus* *Lob.* *Cal.* *Cant.* *Ostrya*
Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis C. B.
Hist. 1428.

Quercus

Quercus

est Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamoso; julifera; glandifera.

Quercus Officinarum. Quercus latifolia Park. Cat. Cant. Quercus vulgaris brevibus ac longis pediculis J. B. Hist. 1389.

Gale

est Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamoso; julifera; seminibus racematim dispositis.

Gale frutex odoratus Septentrionalium J. B. I. 224. Elæagnus Cordi Lob. Cat. Cant. Rhus Myrtifolia Belgica C. B. Hist. 1707.

Populus

est Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamoso; julifera; vasculis lanugine repletis; foliis latis & angulosis.

Populus alba Park. Ger. Tab. Dod. Matth. Cat. Cant. Hist. 1419.

Populus tremula C. B. Pin. 429. Populus Lybica Matth. Dod. Lob. Ger. Park. Cat. Cant. Hist. 1419.

Populus nigra Officinarum. Populus nigra Ger. Park. Dod. Lob. J. B. C. B. Cat. Cant. Hist. 1417.

Salix

est Arbor floribus sexu diversis; fructu non squamoso; julifera; vasculis lanugine repletis: foliis angustioribus.

Salix folio utrinque glauco viminibus rubris Cat. Cant.

Salix Officinarum. Salix folio utrinque glauco viminibus

viminibus albidioribus *Cat. Cant.* *Salix maxima fragilis alba hirsuta* *J. B. Hist.* 1419.

Salix folio lato splendente fragilis *Cat. Cant. Hist.* 1420.

Salix folio splendente auriculato flexilis *Cat. Cant. Hist.* 1420.

Salix humilior foliis angustis subcœruleis ex adverso binis *Hist.* 1421. *Cat. Cant.*

Salix pumila angustifolia inferne lanuginosa *J. B. Hist.* 1420. *Salix humilis repens* *Ger. pumila brevi angustoque folio incano* *C. B. angustifolia Lobelii* *J. B. angustifolia repens* *Park. The narrow-leav'd creeping Dwarf-Willow. In the bog near Gamlingay, where the Phalangium grows.* *Cat. Cant. App.*

Salix folio ex rotundo acuminato auriculata *Cat. Cant.* *Salix latifolia inferne hirsuta* *J. B. Hist.* 1422.

Salix folio subrotundo auriculata *Cat. Cant.*

Salix folio longissimo *Cat. Cant.* *Salix angustis & longissimis foliis crispis subtus albicantibus* *J. B. Hist.* 1423.

Salix folio longo & folio & vimine subluteo non auriculata *Cat. Cant. Hist.* 1423.

Salix folio longo non auriculato vimine rubro *Cat. Cant.*

Salix humilis repens rotundifolia *J. B. Hist.* 1423. *The round-leav'd creeping Dwarf-Willow. In the Bog near Gamlingay where the Phalangium grows.* *Cat. Cant. App.*

Viscus

est *Arbor floribus sexa diversis, fructu non squamoso, humido, parasitica.*

Juniperus

Viscus Officinarum. *Viscum Ger. Cat. Cant.*
Hist. 1583.

Juniperus

est *Arbor floribus sexu diversis, fructu non squamoso,*
humido, tripyreno.

Juniperus Officinarum. *Juniperus Ger. Dod.*
Lob. Cat. Cant. *Juniperus vulgaris baccis parvis*
purpureis J. B. Hist. 1411.

Taxus

est *Arbor floribus sexu diversis, fructu non squamoso,*
humido monopolyreno.

Taxus Ger. Park. Matth. Dod. Lugd. Cam. C. B.
J. B. Cat. Cant. Hist. 1416.

Quæ flores habent androgynos, fructu donantur vel
umbilicato, vel non umbilicato.

GENUS XXVIII.

ARBORES FRUCTU UMBILICATO.

Malus

est *Arbor fructu umbilicato, polypyreno, majore,*
membrana tenuiore tecto, ad imum excavato.

Malus sylvestris Officinarum. Malus sylvestris
sive agrestis J. B. Cat. Cant. Hist. 1448.

Rosa

est *Arbor fructu umbilicato, polypyreno, majore,*
cortice crassiore tecto: flore specioso: folio pin-
nato.

Rosa canina Officinarum. Rosa sylvestris Matth.
Dod. Cat. Cant. Rosa sylvestris inodora sive cani-
na Park. Hist. 1470.

Sorbus
est Arbor fructu umbilicato, polypyreno, majore,
acerbo, nec ante fracedinem eduli, umbellatim
disposito: foliis pinnatis.

Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis. C. B.
Hist. 1457. *sylvestris* sive *Fraxinus bubula* Ger.
Aucuparia f. B. *Ornus* sive *Fraxinus sylvestris*
Park. Quicken-Tree, In Gamlingay Park near the
Osmunda regalis Cat. Cant. App.

Mespilus
est Arbor fructu umbilicato, polypyreno, majore,
acerbo, nec ante fracedinem eduli, officulis sceto.
Mespilus Apii folio *sylvestris* spinosa sive *Oxya-*
cantho C. B. Pin. 454. *Oxyacantha* Ger. Cat.
Cant. Hist. 1458.

Cratægus
est Arbor fructu umbilicato, polypyreno, minore,
seminibus callosis sceto.
Cratægus folio laciniato Tourn. Inst. 633. *Mespi-*
lus Apii folio *sylvestris* non spinosa sive *Sorbus tor-*
minalis G. B. Hist. 1457. *Sorbus torminalis* Ger.
torminalis sive vulgaris Park. Common Service or
Sorb-tree. At Transden. Cat. Cant. App.

Ribes
est Arbor fructu umbilicato, polypyreno, minore,
racemoso, flore herbaceo, magis expanso.
Ribes nigrum vulgo dictum folio olente f. B.
Cat. Cant. Hist. 1486.

Caprifolium
est Arbor fructu umbilicato, polypyreno, minore:
flore

flore tubuloso, inferne clauso, superne in duo labia divisio cornu venatorium quodammodo referente.

Caprifolium Officinarium. Periclymenum Trag.
Fuch. Ger. Cat. Cant. Periclymenum sive Caprifolium vulgare *Park. Hist.* 1490.

Sambucus

est *Arbor fructu umbilicato*, polypyreno, minore, umbellatim aut racematim disposito.

Sambucus Officinarium. Sambucus Ger. Cat. Cant. *Sambucus vulgaris J. B. Park. Hist.* 1609.

Sambucus humilis Officinarium. Ebulus Trag. Matth. Fuch. Tur. Lob. Cat. Cant. *Sambucus humilis sive Ebulus C. B. Hist.* 1611.

Hedera

est *Arbor fructu umbilicato*, polypyreno, minore corymbofo: flore hexapetalo: parasitica.

Hedera arborea Officinarium. Hedera arborea C. B. Matth. Gesn. hort. Lugd. Cat. Cant. *Hedera communis major & minor J. B. Hist.* 1505.

Opulus

est *Arbor fructu umbilicato*, monoppyreno, minore, umbellatim disposito: semine cordiformi.

Opulus Ruelli Tourn. Inst. 607. *Sambucus aquatilis sive palustris Ger. Cat. Cant. Hist.* 1586.

Viburnum

est *Arbor fructu umbilicato*, monoppyreno, minore, umbellatim disposito: semine valde compresso, striato.

Viburnum Park. Matth. Gesn. hort. Cast. Cam. Lugd. Cat. Cant. Hist. 1590.

Cornus

est Arbor fructu umbilicato, monoppyreno; officulo
dispermo: flore tetrapetalo.

Cornus foemina Ger. C. B. Park. Lob. Tab. Cat.
Cant. Hist. 1591

GENUS XXIX.

ARBORES PRUNIFERAE

Fructu non umbilicato, humido, monoppyreno,
majore, officulo duro, fragili a reliquis distinguun-
tur.

Prunus

est Arbor prunifera, officulo oblongo, utrinque acu-
minato: prunis in singulis pediculis singulis.

Prunus sylvestris Officiarium. Prunus sylvestris
C. B. Ger. Park. J. B. Cat. Cant. Hist. 1527.

Prunus sylvestris fructu majore albo. *The white
Bullace.* Cat. Cant. App.

Prunus sylvestris fructu majore nigro. *The black
Bullace.* Both grow very plentifully in many Hedges
of this Country. Cat. Cant. App.

Cerasus

est Arbor prunifera, folio majore, lucido: pedicu-
lis fructus longis: fructu ipso brevioribus & ad basin
latiore, subrotundo aut cordato; officulo pariter
breviore, tumidiore & subrotundo.

Cerasus sylvestris fructu rubro J. B. *Common
Wild Cherry.* In a Thicket nigh Elsworth-wood. Cat.
Cant. App.

Cerasus pumila C. B. J. B. Park. *parad.* Hist.
1539. *Chamaecerasus* Ger. *Dwarf Cherry-tree.* In
some

Some Closes of Teversham going from the Church to-
wards Gains.

GENUS XXX.

ARBORES FRUCTU NON UMBILICA-
TO, HUMIDO, NON PRUNIFERAE.

Laureola

est Arbor fructu non umbilicato, humido, monopy-
reno, minore: flore herbaceo, e tubo oblongo in
quatuor segmenta expanso: foliis perpetuis.

Laureola Officinarum. Laureola Park. Ger. Dod.
Cat. Cant. Hist. 1587.

Ligustrum

est Arbor fructu non umbilicato, humido, dipyreno,
minore: floribus quadripartitis racemosis.

Ligustrum Officinarum. Ligustrum Ger. J. B.
Cat. Cant. Hist. 1653.

Frangula

est Arbor fructu non umbilicato, humido, dipyreno,
minore: seminibus compressis.

Frangula Officinarum. Alnus nigra baccifera
J. B. C. B. Hist. 1604. nigra sive Frangula Ger.
Frangula sive Alnus nigra baccifera Park. The
black Alder. In Gamlingay Park and thereabouts.
Cat. Cant. App.

Berberis

est Arbor fructu non umbilicato, humido, dipyreno,
minore, racemoso: flore hexapetalo, luteo, glo-
boso.

Berberis

Berberis Officinarum. *Oxyacantha* *Hermolao*,
Ruellio, Trag. Fuch. Eyflet. Cat. Cant. *Berberis du-*
metorum C. B. Hist. 1605.

XXX GENUS

Euonymus

est Arbor fructu non umbilicato, humido, tetrapy-
reno, quadrangulo.

Euonymus Matth. Dod. Ang. Tur. Gesn. Ad. Lob.
Cat. Cant. *Euonymus vulgaris* Park. Hist. 1621.

Yqonom. *Agrifolium*

est Arbor fructu non umbilicato, humido, tetrapy-
reno, rotundo: seminibus triquetris.

Agrifolium Ger. Dod. Cam. Cas. Cat. Cant. Hist.
1622.

Rhamnus

est Arbor fructu non umbilicato, humido, tetrapy-
reno; flore quadripartito.

Rhamnus catharticus Officinarum. *Rhamnus*
catharticus J. B. C. B. Cat. Cant. Hist. 1625.

Rubus

est Arbor fructu non umbilicato, humido, ex pluri-
bus protuberantiis composito; flore pentapetalo.

Rubus vulgaris Officinarum. *Rubus* Ger. Cat.
Cant. *Rubus major* fructu nigro J. B. Hist.
1639.

Rubus minor fructu caruleo J. B. Cat. Cant.
Hist. 1640.

GENUS

GENUS XXXI.

ARBORES FRUCTU NON UMBILICA-
TO, SICCO, NON SILIQUOSAE.

Acer

est Arbor fructu sicco, alato ; foliis laciniatis.

Acer majus Ger. emac. 1484. *Acer major* Cord.
hist. Gesn. hort. Cat. Cant. *Acer majus* multis falso
Platanus J. B. Hist. 1701.

Acer minus Ger. emac. Cat. Cant. Hist. 1700.

Fraxinus

est Arbor fructu sicco, alato ; foliis pinnatis.

Fraxinus Officinarum. *Fraxinus vulgaris* Ger.
Park. Cat. Cant. *Fraxinus vulgarior* J. B. Hist.
1702.

Staphylodendron

est Arbor fructu sicco, in vesicam inflato : floribus
pentapetalis ; racemosis.

Staphylodendron J. B. Ad. Lob. Cam. Tab. Cat.
Cant. Hist. 1681.

Scopa

est Arbor fructu sicco, flore quadripartito ; foliis
squamosis.

Scopa prior Cas. 3. 20. *Erica vulgaris* Ger. Park.
Trag. Cat. Cant. Hist. 1713.

Ulmus

est Arbor fructu sicco, membranaceo, compresso :
floribus apetalis.

Ulmus

Ulmus vulgarissimus folio lato scabro *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 1425.

Ulmus folio glabro *Ger. emac. Park. Cat. Cant. Hist.* 1426.

Ulmus folio latissimo scabro *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 1426.

GENUS XXXII.

ARBORES SILIQUOSAE.

Coroneola

est *Arbor siliquosa*, flore papilionaceo; calyce unifolio, margine quinquepartito: siliqua compressa: seminibus reniformibus.

Coroneola *Cas.* 6. 39. *Genistella infectoria* *Ad. Lob. Ger. Cat. Cant.* *Genistella tinctoria* *Ger. Hist.* 1725.

Scorpius

est *Arbor siliquosa*, flore papilionaceo; calyce in duo segmenta ad basin usque fisso: siliquis compressis.

Scorpius major vulgaris. *Genista spinosa vulgaris* *Ger. emac. Cat. Cant. Hist.* 1729.

Genistella

est *Arbor siliquosa*, flore papilionaceo; calyce in margine quinquepartito: siliquis tumidiusculis.

Genistella aculeata *Park. Cat. Cant.* *Genista minor Aspalathoides seu Genista spinosa Anglica* *C. B. Hist.* 1731.

Genista

Genista

est *Arbor filiquosa*, flore papilionaceo; calyce unifolio, in duo segmenta ad medium usque diviso: filiquis compressis.

Genista Officinarum. *Genista Ger. Cat. Cant.*
Genista angulosa trifolia *J. B. Hist. 1723.*

F I N I S.



INDEX ALPHABETICUS.

A		
A Blnthium	31	Arum 63
Acer	123	Arundo 107
Acetosa	12	ASPERIFOLIÆ 45
Acinos	52	Asperula 45
Agaricus	3	Asperugo 47
Agrifolium	122	Aster 26
Agrimonia	36	Astragalus 88
Alcea	55	Atriplex 17
Alchimilla	18	Avena 107
Alisma	55	
Alliaria	78	B
Allium	101	BACCIFERÆ 62
Alnus	113	Ballote 52
Alopecuroides	105	Barbarea 79
Alfine	94	Becabunga 69
Althæa	59	Belladonna 62
Alfinella	83	Bellis 29
Alfinoides	76	Berberis 121
Amanita	2	Betonica 50
Anagallis	70	Betula 113
Anemonoides	60	Bidens 30
Angelica	40	Biftorta 15
Anonis	89	Blitum 17
APETALI FLORES	10	Boletus 2
Aphaca	85	Bryonia 61
Apium	41	BUGLOSSACEÆ 45
Aponogeton	13	Buglossum 46
Aquilegia	65	Bugula 54
Aristolochia	74	Bulbocastanum 39
Artemisia	31	BULBACEÆ 99
		Bupleurum 43
		Bursa

Burfa pastoris	81	Cicuta	41
Butomus	65	Circæa	77
Calamagrostis	106	Cirsium	32
Calamintha	53	Clematidis	60
Calcitrapa	33	Clinopodium	52
Caltha	65	Cochlearia	81
Campanula	67	Comaroides	59
Cannabis	11	Conserua	4
CAPILLARES	6	Convolvulus	67
CAPITATÆ	31	Conyza	28
Caprifolium	118	Cornus	120
Carara	81	Coroneola	124
Cardamine	80	Corylus	114
Cardiaca	53	CORYMBIFERÆ	29
Carduus	31	Crassula	64
Carlina	33	Cratægus	118
Carpinus	114	Cruciata	43
Carum	40	CUCURBITACEÆ	61
Caryophyllata	58	Cuscuta	69
Caucalis	42	Cyanus	34
Centaureum minus	73	Cynoglossum	45
Cepa	101	Cyperoides	109
Cerasus	120	Cyperus	108
CEREALES	104	Cystitriphyllum	89
Chærophyllyum	38		
Chamæcissus	53		
Chamædrys	48	Delphinium	66
Chamæmelum	29	Dens Leonis	23
Chamænerion	82	Dichotophyllon	12
Chamæpitys	54	Dipsacus	35
Chelidonium	82	Draba	78
Chenopodium	17	Dryopteris	8
CICHORACEÆ	21		
Cichorium	25	E	
		Echioides	46
		Echium	46
		Elatine	

Elatine	75	Glaucium	82
Equisetum	12	Glycyrrhiza	86
Eragrostis	118	Gymnomonospermæ	36
Eriocephalus	33	Gymnopolyspermæ	55
Erysimum	79		
Euonymus	122	H	
Eupatorium	28		
Euphrasia	75	Hedera	119
F		Helianthemum	92
Faba	86	Helleborine	103
Begopyron	14	Helminthotheca	24
Ferrum equinum	87	Helleborine	103
Ferulacæ	36	Helleborus	64
Festuca	108	Herba Paris	62
Ficaria	60	Hieracioides	23
Filago	27	Hieracium	22
Filipendula	60	Hippagrostis	106
Filix foemina	7	Hippuris	12
Filix mas	6	Hordeum	105
Flos cuculi	92	Horminum	49
Fragaria	58	Hyacinthus	99
Fraxinus	123	Hydrocotyle	43
Fumaria	36	Hyoscyamus	65
FUNGI	2	Hypericum	93
G		Hypnum	4
Gale	115	Hypochæris	24
Galeobdolon	51	I	
Galeopsis	50	Jacea	34
Gallium	44	Jacobæa	26
Genista	125	Iberis	81
Genistella	124	Iris	100
Gentiana	65	Juncago	112
Geranium	96	Juncus	111
Glaſtum	82	Juniperus	117
		K	
		Knawel	

Nasturtium	nobisquod	80	Phellandrium	solu	41
Nenuphar	sinchis	98	Pilosella	M	23
Nepeta		50	Pimpinella saxifraga		40
Nissolia	M	87	Pinguicula		74
Nummularia	evla	71	Pisum		84
Ndx	an	114	PLANIPETALAE	LAC-	
Nymphaea	nuttidit	98	TESCENTES	ATAIS	21
Nymphoides	nuttidit	83	Plantaginella	son	72
O	aitat		Plantago	nuttidit	19
Odontites	mp	73	Podagraria	an	39
Oenanthe	an	39	Polygala	nuttidit	70
Orobrychis	an	68	Polygonum	an	13
Ophioglossum	an	9	Polypodium	an	6
Orchis	an	101	Polytrichum	nuttidit	4
Ornithogalum	an	100	POMIFERAE		61
Ornithopodium	an	87	Populus	an	13
Orobanche	nuttidit	77	Portula	an	98
Osmunda	an	13	Potamogeton	an	10
Oxycoccus	an	83	Primula veris	an	70
Oxys	an	73	Prunella	an	30
P	an		Prunus	nuttidit	20
Papaver	an	82	Pseudo-Cyperus	an	10
Papposae	an	25	Pseudo-Marrubium	an	49
Parietaria	an	100	Pseudo-Melanthium	an	91
Parnassia	an	68	Pseudo-Orchis	an	102
Pastinaca	an	88	Pulegium	an	49
Pedicularis	an	75	Pulsatilla	an	60
Pentaphylloides	an	100	Q.	an	
Pentapterophylla	an	87	Quercus	nuttidit	113
Percepier	an	100	Quinquefolium	an	59
Perfoliata	an	100	R.	an	
Perficaria	an	100	Radicula	an	81
Pervinca	an	63	Radix cava	an	103
Petasites	an	28	Ranunculoides	an	57
Phalangium	an	100	Ranuncu-		

Ranunculus	56	Sedum	64
Rapum	79	Senecio	28
Rapunculus	68	Serpyllum	48
Reseda	20	Serratula	34
Rhamnus	127	Seseli	41
Ribes	118	SLICULOSÆ	77
Ros solis	97	SLIQUOSÆ	77
Rosa	117	Sinapi	79
Rubeola	45	Sium	39
Rubus	122	Smyrnium	40
Ruscus	62	Solanum	62
Ruta muraria	8	Sonchus	21
S		Sophia	79
		Sorbus	118
Sagitta	56	Sparganium	112
Salicaria	98	Spartum	106
Salix	115	Speculum Veneris	68
Sambucus	119	Spergula	95
Samolus	72	Sphondylium	36
Sanguisorba	19	Staphylodendron	123
Sanicula	43	Staphylinus	42
Saponaria	92	Stellaria	77
Saxifraga	95	STELLATÆ	43
Scabiosa	35	Strabotes	77
Scandix	38	SUBMARINÆ	2
Scirpoides	110	Symphytum	47
Scirpus	110		
Scopa	123		
Scordium	54	Tamarum	61
Scorpius	122	Tanacetum	30
Scorpiurus	57	Taraxaconoides	23
Scorzonera	24	Taxus	117
Scrophularia	74	Thalictrum	20
Scutellaria	54	Tithymalus	70
Secale	104	Tormentilla	56

Tragopo-

Tragopogon	24	—	TETRAPETALÆ	77
Trichomanes	7	—	PENTAPETALÆ	91
Trifolium	88	—	HEXAPETALÆ	98
Triticum	104	—	POLYPETALÆ	98
Turritis	78	Verbasum		73
Tussilago	25	Verbena		49
Typha	112	Veronica		88
Typhoides	106	VERTICILLATÆ		47
		Viburnum		110
	V	Vicia		84
		Viola		97
Valeriana	36	Virga aurea		27
Valerianastrum	36	Viscus		116
Valerianella	36	Ulmaria		65
VASCULIFERÆ	Mo-	Ulmus		123
NO PETALÆ		UMBELLIFERÆ		36
— DIPETALÆ		Urtica		11
— TRIPETALÆ		Vulneraria		86



MUSEVM
BRITAN
NICVM